PREPORUKA ZA GAJENJE

Riviera.

Prva rana skonzumna sorta sa atraktivnom pokožicom, odličnom tolerancijom na toplotu, dobra otpornost na viruse, i rani dobar prinos.

Tradicionalno



- **Krupne krtole**
- **Prelep izgled**
- **Dobra otpornost na viruse**

Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Mts. Boerhave
Ukrštanje: MINERVA x ALCMARIA
Pravo oplemenjivača: 31-12-2030
Perspekrtivni klonovi: BH 86-0266

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: prva rana / 8
Svetla boja klice: plavo-ljubičasta / BV
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: veoma visok / 4
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7
Cima - završni razvoj: prosečan / 7
Cima - čvrstina: prosečna / 6,5
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svetlo žuta / 6
Formiranost pokožice: odlična / 8
Oblik krtola: ovalno-okrugle / OR
Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6
Tuberizacija: prilično malo / 5
Krupnoća krtola: prilično krupne / 7,5
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: srednja / 6

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5
Unutrašnje modrice: blago do nije osetljiva / 8
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6,5
Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6
Metribuzin - pre nicanja: blago do nije osetljiva / 8
Metribuzin - posle nicanja: blago do nije osetljiva / 8
Bentazon: - / -
Etilen: 5% do 15% više krtola / 6
Specifična težina u vodi: 318
Sadržaj suve materije: 17,7%
Tip raskuvavanja: prilično čvrsta / AB
Tamnjenje posle raskuvavanja: osetljiva / 5,5
Promena boje pre kuvanja: - / -
Kvalitet za prženje: nije pogodna / 4,5
Distribucija suve materije: - / -
Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 4
TGA-nivo: 4,8

Agrico je uložio zavidan napor da bi se dobio što precizniji opis ove sorte. Međutim, imajte na umu da sve informacije mogu biti podložne promeni i Agrico ne prihvata odgovornost za greške ili propuste. Agrico ni u kom slučaju neće biti odgovoran za štetu koja nastane kod nas ili u vezi sa informacijama sadržanim u ovom opisu.

PREPORUKA ZA GAJENJE

Preporuke za gajenje

www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena [1]

Azot: standardni savet +10 %.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet.

Tretman semena

Pravilno naklijavanje posle zalamanja vršne klice daje pozitivan uticaj na bolje zametanje krtola.Zalamanje klice više od jedan put imaće negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) ne daje reakciju na cimi ili smanjenju prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 4 ºC Pogodna za isporuku direktno sa njive ili posle kraćeg skladištenja



Say potato, say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: blago osetljiva / 7

Virus - Yn: blago do nije osetljiva / 8

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7

Prskanje: veoma osetljiva / 4

Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 3

Plamenjača - krtole: osetljiva / 5

Fusarium: blago osetljiva / 6

Obična krastavost: osetljiva / 5,5

Prašna krastavost: veoma osetljiva / 2

Crne pege: osetljiva / 5,5

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -

Arum Deč. • Borhesova 31 • 11080 Beograd • Zemun Srbija (+381) 11 3774 706
info@arum.rs www.agricopotatoes.rs