

Riviera.



Tradicionalno

Prva rana skonzumna sorta sa atraktivnom pokožicom, odličnom tolerancijom na toplotu, dobra otpornost na viruse, i rani dobar prinos.

- **Krupne krtole**
- **Prelep izgled**
- **Dobra otpornost na viruse**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Mts. Boerhave
 Ukrštanje: MINERVA x ALCMARIA
 Pravo oplemenjivača: 31-12-2030
 Perspektivni klonovi: BH 86-0266

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: prva rana / 8
 Svetla boja klice: plavo-ljubičasta / BV
 Boja cveta: bela / W
 Broj bobica: veoma visok / 4
 Cima - početni razvoj: prilično brz / 7
 Cima - završni razvoj: prosečan / 7
 Cima - čvrstina: prosečna / 6,5
 Boja pokožice: žuta / Y
 Boja mesa: svetlo žuta / 6
 Formiranost pokožice: odlična / 8
 Oblik krtola: ovalno-okrugle / OR
 Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6
 Tuberizacija: prilično malo / 5
 Krupnoća krtola: prilično krupne / 7,5
 Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
 Dormantnost: srednja / 6

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5
 Unutrašnje modrice: blago do nije osetljiva / 8
 Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6,5
 Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6
 Metribuzin - pre nicanja: blago do nije osetljiva / 8
 Metribuzin - posle nicanja: blago do nije osetljiva / 8
 Bentazon: - / -
 Etilen: 5% do 15% više krtola / 6
 Specifična težina u vodi: 318
 Sadržaj suve materije: 17,7%
 Tip raskuvavanja: prilično čvrsta / AB
 Tamnjenje posle raskuvavanja: osetljiva / 5,5
 Promena boje pre kuvanja: - / -
 Kvalitet za prženje: nije pogodna / 4,5
 Distribucija suve materije: - / -
 Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 4
 TGA-nivo: 4,8

Kako gajiti

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet +10 %.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet.

Tretman semena

Pravilno naklijavanje posle zalamanja vršne klice daje pozitivan uticaj na bolje zemetanje krtola. Zalamanje klice više od jedan put imaće negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)



www.agricopotatoes.rs

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) ne daje reakciju na cimi ili smanjenju prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 4 °C Pogodna za isporuku direktno sa njive ili posle kraćeg skladištenja.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: blago osetljiva / 7

Virus - Yn: blago do nije osetljiva / 8

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7

Prskanje: veoma osetljiva / 4

Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 3

Plamenjača - krtole: osetljiva / 5

Fusarium: blago osetljiva / 6

Obična krastavost: osetljiva / 5,5

Prašna krastavost: veoma osetljiva / 2

Crne pege: osetljiva / 5,5

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -