


Rudolph.



Tradicionalno

Glavni usev, konzumna sorta sa atraktivnom crvenom pokožicom, dobra otpornost na visoke temperature i veoma visok prinos.

- ▶ **Bela boja mesa**
- ▶ **Krupne krtole**
- ▶ **Dobro skladištenje**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Agrico Research B.V.
 Ukrštanje: CHIEFTAIN x STIRLING
 Pravo oplemenjivača: 31-12-2035
 Perspektivni klonovi: UK 93-1-2

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: rani glavni usev / 5,5
 Svetla boja klice: crveno-ljubičasta / RV
 Boja cveta: svetlo ljubičasta / LP
 Broj bobica: prosečno / 6
 Cima - početni razvoj: prosečan / 6
 Cima - završni razvoj: dobar / 8
 Cima - čvrstina: čvrsta / 8
 Boja pokožice: crvena / R
 Boja mesa: bela / 4
 Formiranost pokožice: dobra / 7
 Oblik krtola: ovalno-okrugle / OR
 Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6
 Tuberizacija: prilično malo / 5
 Krupnoća krtola: krupne / 8
 Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
 Dormantnost: prilično duga / 7

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5
 Unutrašnje modrice: blago osetljiva / 7
 Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6
 Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6
 Metribuzin - pre nicanja: blago do nije osetljiva / 8
 Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7,5
 Bentazon: - / -
 Etilen: 5% do 15% više krtola / 6
 Specifična težina u vodi: 376
 Sadržaj suve materije: 20,5%
 Tip raskuvavanja: prilično čvrsta / AB
 Tamnjenje posle raskuvavanja: prilično osetljiva / 6,5
 Promena boje pre kuvanja: - / -
 Kvalitet za prženje: iznad proseka / 6,5
 Distribucija suve materije: - / -
 Kvalitet hrskavosti: ispod proseka / 5,5
 TGA-nivo: 5,5

Preporuke za gajenje



www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet + 5 %. Poželjna je split aplikacija, drugu prihranu uraditi ubrzo posle zasetanja krtola.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +10 %.

Tretman semena

Preporučuje se kratak temperaturni šok ili pravilno naklijavanje. Pravilno naklijavanje posle zalamanja vršne klice daje pozitivan uticaj na bolje zasetanje krtola. Jedno zalamanje klice je opcija.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) može dati reakciju na cimi i malo umanjeње prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje tri nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Za potrebe prerade, ne skladištite ispod 7 °C. Pogodna za duže skladištenje.



Say potato,
say **Agrico.**

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: osetljiva / 5

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7

Prskanje: blago osetljiva / 7

Plamenjača - cima: osetljiva / 5,5

Plamenjača - krtole: osetljiva / 5,5

Fusarium: blago osetljiva / 6

Obična krastavost: osetljiva / 5

Prašna krastavost: blago osetljiva / 7

Crne pege: blago osetljiva / 7

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: srednje osetljiva / 8

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: - / -

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -