

Spectra.

Druga rana, konzumna sorta sa visokim prinosom, veoma pravilnim oblikom krtola i atraktivnom glatkom pokožicom.




Maloprodaja
Svež



Tradicionalno

- » **Krupne krtole**
- » **Dobra tuberizacija**
- » **Uniformna krupnoća krtola**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Lantmännen Seed B.V.
Ukrštanje: ARIELLE x SOFIA
Pravo oplemenjivača: 31-12-2046
Perspektivni klonovi: SW 05-1431

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: drugi rani / 7
Svetla boja klice: crveno-ljubičasta / RV
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: veoma visok / 4
Cima - početni razvoj: brz / 8
Cima - završni razvoj: prilično dobar / 7,5
Cima - čvrstina: prosečna / 6,5
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svetlo žuta / 6
Formiranost pokožice: veoma dobra / 7,5
Oblik krtola: ovalno-okrugle / OR
Pravilnost oblika krtola: pravilan / 7,5
Tuberizacija: prilično velika / 7
Krupnoća krtola: prilično krupne / 7,5
Pravilnost krupnoće: prilično pravilan / 6,5
Dormantnost: prilično kratka / 5

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5
Unutrašnje modrice: blago osetljiva / 7,5
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6
Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6
Metribuzin - pre nicanja: blago osetljiva / 7
Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7,5
Bentazon: blago do nije osetljiva / 8
Etilen: 5% manje do 5% više krtola / 5
Specifična težina u vodi: 324
Sadržaj suve materije: 17,9%
Tip raskuvavanja: prilično čvrsta / AB
Tamnjenje posle raskuvavanja: prilično osetljiva / 6
Promena boje pre kuvanja: veoma osetljiva / 4
Kvalitet za prženje: nije pogodna / 4,5
Distribucija suve materije: - / -
Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 4
TGA-nivo: 4,7

Preporuke za gajenje



www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet.

Tretman semena

Može se saditi direktno po iznošenju iz hladnog skladišta, poželjno je posle izlaganja kratkom temperaturnom šoku. Zalamanje klice može imati negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 biljaka/ha)

Saditi sortu Spectra malo dublje u odnosu na druge sorte da bi se izbeglo zelenjenje krtola.

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) može dati reakciju na cimi i malo umanjeње prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 4 °C Pogodna za kraće skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: blago osetljiva / 6

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7

Prskanje: osetljiva / 5

Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 4,5

Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 6

Fusarium: osetljiva / 5,5

Obična krastavost: osetljiva / 5

Prašna krastavost: veoma osetljiva / 4

Crne pege: osetljiva / 5

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -