

Jolene.

Rani glavni usev sa dobrom pokožicom i pogodna za kućni pomfrit.




Maloprodaja
Svež



Tradicionalno

- ▶ **Svetlo žuta boja pokožice**
- ▶ **Pogodna za različita jela**
- ▶ **Dobar sadržaj suve materije**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcionar: Agrico Research B.V.
Ukrštanje: SAGITTA x AR 03-1491
Pravo oplemenjivača: 31-12-2050
Perspektivni klonovi: AR 09-2556

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: rani glavni usev / 6
Svetla boja klice: crvena / R
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: ispod proseka / 7
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7,5
Cima - završni razvoj: dobar / 8
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7,5
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svetlo žuta / 6
Formiranost pokožice: dobra / 7
Oblik krtola: ovalno-izdužene / OL
Pravilnost oblika krtola: pravilan / 7
Tuberizacija: prilično velika / 7
Krupnoća krtola: prilično krupne / 7,5
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: srednja / 6

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: blago osetljiva / 7
Unutrašnje modrice: blago osetljiva / 7
Pucanje krtola: blago osetljiva / 7
Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6
Metribuzin - pre nicanja: prilično osetljiva / 6,5
Metribuzin - posle nicanja: blago do nije osetljiva / 8
Bentazon: - / -
Etilen: 15% do 25% više krtola / 7
Specifična težina u vodi: 389
Sadržaj suve materije: 21,1%
Tip raskuvavanja: prilično brašnava / B
Tamnjenje posle raskuvavanja: prilično osetljiva / 6,5
Promena boje pre kuvanja: blago osetljiva / 7
Kvalitet za prženje: dobra / 7
Distribucija suve materije: - / -
Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 5
TGA-nivo: 6,9



Preporuke za gajenje

www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +10 %.

Tretman semena

Može se saditi direktno po iznošenju iz hladnog skladišta, poželjno je posle izlaganja kratkom temperaturnom šoku. Zalamanje klice više od jedan put imaće negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) može dati reakciju na cimi i malo umanjeње prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Pogodna za kraće skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: blago do nije osetljiva / 8

Virus - Yntn (na krtolama): blago do nije osetljiva / 8

Prskanje: blago osetljiva / 6

Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 4

Plamenjača - krtole: osetljiva / 5

Fusarium: blago osetljiva / 6

Obična krastavost: blago osetljiva / 6

Prašna krastavost: blago osetljiva / 6,5

Crne pege: blago osetljiva / 7,5

Rak krompira F1: - / -

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: - / -

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -