

Napoleon.



Prerada
Čips

Glavni usev, hrskava sorta sa dobrom uniformnošću krtola i visokim sadržajem suve materije.

- » Dobar kvalitet hrskavosti
- » Pogodna za preradu u pahuljice.
- » Dobra otpornost na viruse



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Agrico Research B.V.
Ukrštanje: ANTINA x ALICANTE
Pravo oplemenjivača: 31-12-2051
Perspektivni klonovi: AR 10-4637

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: glavni usev / 5
Svetla boja klice: crveno-ljubičasta / RV
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: veoma visok / 4
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7
Cima - završni razvoj: dobar / 8
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7,5
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svetlo žuta / 6,5
Formiranost pokožice: prilično loša / 5
Oblik krtola: okruglo-ovalne / RO
Pravilnost oblika krtola: pravilan / 7
Tuberizacija: srednja / 6
Krupnoća krtola: prilično krupne / 7,5
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: srednja / 6

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5
Unutrašnje modrice: osetljiva / 5,5
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6
Povrede kod vađenja: veoma osetljiva / 4,5
Metribuzin - pre nicanja: blago osetljiva / 7
Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7
Bentazon: - / -
Etilen: 5% manje do 5% više krtola / 5
Specifična težina u vodi: 450
Sadržaj suve materije: 24,1%
Tip raskuvavanja: brašnava / BC
Tamnjenje posle raskuvavanja: prilično osetljiva / 6
Promena boje pre kuvanja: prilično osetljiva / 6
Kvalitet za prženje: dobra / 7
Distribucija suve materije: dobar / 7
Kvalitet hrskavosti: odlična / 8
TGA-nivo: 4,0

Preporuke za gajenje



www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet -10 %.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +20 %.

Tretman semena

Pravilno naklijavanje posle zalamanja vršne klice daje pozitivan uticaj na bolje zemetanje krtola. Zalamanje klice može imati negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) ne daje reakciju na cimi ili smanjenju prinosa.

Fungicidi

Savetuje se preventivno prskanje protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje tri nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Za potrebe prerade, ne skladištite ispod 9 °C. Pogodna za srednji do dug period skladištenja.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: blago do nije osetljiva / 8

Virus - Yntn (na krtolama): blago do nije osetljiva / 8

Prskanje: osetljiva / 5

Plamenjača - cima: blago osetljiva / 6

Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 6,5

Fusarium: blago osetljiva / 6,5

Obična krastavost: blago osetljiva / 6

Prašna krastavost: - / -

Crne pege: blago osetljiva / 6

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: osetljiva / 4

Bele nematode Pa 3: osetljiva / 2