PREPORUKA ZA GAJENJE

Sinora.

Drugi rani, visokog prinosa i sorta laka za gajenje za rani pomfrit i pahuljice.

Prerada
Pomfrit
Čips

- **Rana isporuka direktno sa njive**
- **Visok sadržaj suve materije**
- **Dobra otpornost na viruse**

Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: J. Schilt
Ukrštanje: AGRIA x AM 70-2166
Pravo oplemenjivača: 31-12-2027
Perspekrtivni klonovi: SI 85-0482

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: drugi rani / 7
Svetla boja klice: plavo-ljubičasta / BV
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: veoma visok / 4
Cima - početni razvoj: brz / 8
Cima - završni razvoj: dobar / 8
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7,5
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svetlo žuta / 6,5
Formiranost pokožice: prosečna / 6
Oblik krtola: ovalno-okrugle / OR
Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6
Tuberizacija: prilično velika / 7
Krupnoća krtola: prilično krupne / 7
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: srednja / 6

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6,5
Unutrašnje modrice: prilično osetljiva / 6,5
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6,5
Povrede kod vađenja: veoma osetljiva / 4,5
Metribuzin - pre nicanja: blago do nije osetljiva / 8
Metribuzin - posle nicanja: blago do nije osetljiva / 8
Bentazon: prilično osetljiva / 6,5
Etilen: - / -
Specifična težina u vodi: 416
Sadržaj suve materije: 22,6%
Tip raskuvavanja: prilično brašnava / B
Tamnjenje posle raskuvavanja: osetljiva / 5
Promena boje pre kuvanja: osetljiva / 5
Kvalitet za prženje: veoma dobra / 7,5
Distribucija suve materije: dobar / 7
Kvalitet hrskavosti: dobra / 7
TGA-nivo: 8,2

Agrico je uložio zavidan napor da bi se dobio što precizniji opis ove sorte. Međutim, imajte na umu da sve informacije mogu biti podložne promeni i Agrico ne prihvata odgovornost za greške ili propuste. Agrico ni u kom slučaju neće biti odgovoran za štetu koja nastane kod nas ili u vezi sa informacijama sadržanim u ovom opisu.

PREPORUKA ZA GAJENJE

Preporuke za gajenje

www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena [1]

Azot: standardni savet +25 %.Ne preporučuje se upotreba stajnjaka.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +10 %.

Tretman semena

Pravilno naklijavanje posle zalamanja vršne klice daje pozitivan uticaj na bolje zametanje krtola.Zalamanje klice više od dva puta imaće negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) ne daje reakciju na cimi ili smanjenju prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 ⁰C. Za potrebe prerade, ne skladištite ispod 7 ⁰C. Pogodna za isporuku direktno sa njive ili posle kraćeg

Say potato, say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: blago osetljiva / 6

Virus - Yn: blago osetljiva / 7

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7

Prskanje: blago osetljiva / 6

Plamenjača - cima: veoma osetljiva / 4,5

Plamenjača - krtole: osetljiva / 5

Fusarium: blago osetljiva / 6

Obična krastavost: osetljiva / 5,5

Prašna krastavost: osetljiva / 5

Crne pege: - / -

Rak krompira F1: - / -

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: osetljiva / 4

Bele nematode Pa 3: osetljiva / 2

AGRICO

Arum Deč. • Borhesova 31 • 11080 Beograd • Zemun Srbija (+381) 11 3774 706

info@arum.rs www.agricopotatoes.rs

ARUM DEČ