

Beyonce.

Rani glavni usev, hrskava sorta sa dobrim sadržajem suve materije, pogodna za srednje skladištenje, sa dobrom otpornošću na plamenjaču cime i krtola.



Organska



Prerada
Čips
Pahuljice



- ▶ **Krupne krtole**
- ▶ **Dobra dormantnost**
- ▶ **Prilično visoka tuberizacija**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcioner: Agrico Research B.V.
Ukrštanje: AR 94-2061 x LADY JO
Pravo oplemenjivača: 31-12-2049
Perspektivni klonovi: AR 08-3271

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: rani glavni usev / 3
Svetla boja klice: plavo-ljubičasta / BV
Boja cveta: ljubičasta / P
Broj bobica: veoma visok / 4
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7,5
Cima - završni razvoj: dobar / 8
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7,5
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svetlo žuta / 6,5
Formiranost pokožice: ispod proseka / 5,5
Oblik krtola: ovalno-okrugle / OR
Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6,5
Tuberizacija: prilično velika / 7
Krupnoća krtola: prilično krupne / 7,5
Pravilnost krupnoće: pravilan / 7
Dormantnost: prilično duga / 7

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6
Unutrašnje modrice: blago osetljiva / 7,5
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6,5
Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6
Metribuzin - pre nicanja: prilično osetljiva / 6,5
Metribuzin - posle nicanja: blago osetljiva / 7
Bentazon: blago do nije osetljiva / 8
Etilen: 5% manje do 5% više krtola / 5
Specifična težina u vodi: 446
Sadržaj suve materije: 23,9%
Tip raskuvavanja: brašnava / BC
Tamnjenje posle raskuvavanja: blago osetljiva / 7
Promena boje pre kuvanja: blago do nije osetljiva / 8
Kvalitet za prženje: dobra / 7
Distribucija suve materije: srednji / 6,5
Kvalitet hrskavosti: odlična / 8
TGA-nivo: 6,5

Kako gajiti

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +25 %.

Tretman semena

Može se saditi direktno po iznošenju iz hladnog skladišta, poželjno je posle izlaganja kratkom temperaturnom šoku. Zalamanje klice može imati negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 23 cm (58.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)



www.agricopotatoes.rs

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) ne daje reakciju na cimi ili smanjenju prinosa.

Fungicidi

Uprkos otpornosti na plamenjaču, budite oprezni za infekcije.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Za potrebe prerade, ne skladištite ispod 9 °C. Pogodna za kraće skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: osetljiva / 5,5

Virus - Yntn (na krtolama): osetljiva / 5

Prskanje: blago osetljiva / 6

Plamenjača - cima: blago do nije osetljiva / 8,5

Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 7,5

Fusarium: blago osetljiva / 7,5

Obična krastavost: osetljiva / 5,5

Prašna krastavost: blago osetljiva / 6

Crne pege: blago osetljiva / 7,5

Rak krompira F1: - / -

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: osetljiva / 4

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -