

Fontane.

Rana sorta, visoko prinosa sorta za preradu u pomfrit i proizvodnju pirea



Prerada
Pomfrit
Čips
Pahuljice

- ▶ **Velike krtole**
- ▶ **Visok sadržaj suve materije**
- ▶ **Pogodna za proizvodnju na različitim tipovima zemljišta**



the
ORIGINAL

Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcionar: Lantmännen Seed B.V.
Ukrštanje: AGRIA x AR 76-034-03
Pravo oplemenjivača: 31-12-2028
Perspektivni klonovi: SW 87-1140

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: rani glavni usev / 5,5
Svetla boja klice: plavo-ljubičasta / BV
Boja cveta: bela / W
Broj bobica: iznad proseka / 5
Cima - početni razvoj: prilično brz / 7,5
Cima - završni razvoj: prosečan / 7
Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svetlo žuta / 6,5
Formiranost pokožice: prilično loša / 5
Oblik krtola: ovalne / O
Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6,5
Tuberizacija: prilično velika / 7
Krupnoća krtola: prilično krupne / 7
Pravilnost krupnoće: prilično pravilan / 6
Dormantnost: prilično kratka / 5,5

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: prilično osetljiva / 6
Unutrašnje modrice: prilično osetljiva / 6
Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6
Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6
Metribuzin - pre nicanja: blago do nije osetljiva / 8
Metribuzin - posle nicanja: blago do nije osetljiva / 8
Bentazon: prilično osetljiva / 6
Etilen: 15% do 25% više krtola / 7
Specifična težina u vodi: 430
Sadržaj suve materije: 23,2%
Tip raskuvavanja: brašnava / BC
Tamnjenje posle raskuvavanja: prilično osetljiva / 6,5
Promena boje pre kuvanja: osetljiva / 5,5
Kvalitet za prženje: veoma dobra / 7,5
Distribucija suve materije: srednji / 6,5
Kvalitet hrskavosti: prosečna / 6
TGA-nivo: 6,1

Kako gajiti



www.agricopotatoes.rs

Dubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet +30 %.Moguća je upotreba stajnjaka.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet +10 %.

Tretman semena

Može se saditi direktno po iznošenju iz hladnog skladišta, poželjno je posle izlaganja kratkom temperaturnom šoku.Zalamanje klice više od dva puta imaće negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 plants/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) ne daje reakciju na cimi ili smanjenju prinosa.

Fungicidi

Neophodan je strogi preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje tri nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 5 °C. Za potrebe prerade, ne skladištite ispod 7 °C. Pogodna za duže skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: blago osetljiva / 6

Virus - Yn: osetljiva / 5,5

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7

Prskanje: blago osetljiva / 6,5

Plamenjača - cima: osetljiva / 5

Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 6,5

Fusarium: blago osetljiva / 6

Obična krastavost: blago osetljiva / 6

Prašna krastavost: blago osetljiva / 6

Crne pege: - / -

Rak krompira F1: prilično osetljiva / 6

Rak krompira F6: srednje osetljiva / 8

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -