


Paradiso.



Tradicionalno

Rani glavni usev, krupne krtole sa odličnim prinosom, za tradicionalno tržište.

- » **Krupne krtole**
- » **Predivan izgled**
- » **Dobra tolerancija na modrice**



Karakteristike

Opšte karakteristike

Selekcionar: M. Pot & M. Klaver
 Ukrštanje: RODEO x VALOR
 Pravo oplemenjivača: 31-12-2048
 Perspektivni klonovi: PK 06-0108

Karakteristike biljke i krtola

Stasavanje: rani glavni usev / 6
 Svetla boja klice: crvena / R
 Boja cveta: ljubičasta / P
 Broj bobica: ispod proseka / 6,5
 Cima - početni razvoj: prilično brz / 7,5
 Cima - završni razvoj: prilično dobar / 7,5
 Cima - čvrstina: prilično čvrsta / 7
 Boja pokožice: žuta / Y
 Boja mesa: svetlo žuta / 6
 Formiranost pokožice: dobra / 7
 Oblik krtola: ovalno-izdužene / OL
 Pravilnost oblika krtola: prilično pravilan / 6,5
 Tuberizacija: srednja / 6
 Krupnoća krtola: krupne / 8
 Pravilnost krupnoće: prilično pravilan / 6,5
 Dormantnost: srednja / 6

Osetljivost i kvalitet

Sekundarni rast: blago osetljiva / 7
 Unutrašnje modrice: blago osetljiva / 7,5
 Pucanje krtola: prilično osetljiva / 6,5
 Povrede kod vađenja: prilično osetljiva / 6,5
 Metribuzin - pre nicanja: blago do nije osetljiva / 8
 Metribuzin - posle nicanja: prilično osetljiva / 6,5
 Bentazon: prilično osetljiva / 6,5
 Etilen: 5% do 15% više krtola / 6
 Specifična težina u vodi: 329
 Sadržaj suve materije: 18,2%
 Tip raskuvavanja: prilično brašnava / B
 Tamnjenje posle raskuvavanja: prilično osetljiva / 6,5
 Promena boje pre kuvanja: - / -
 Kvalitet za prženje: nije pogodna / 4,5
 Distribucija suve materije: - / -
 Kvalitet hrskavosti: nije pogodna / 4
 TGA-nivo: 4,8

Preporuke za gajenje



www.agricopotatoes.rs

Đubrenje i tretman semena ¹

Azot: standardni savet - 20 %. Poželjna je split aplikacija, drugu prihranu uraditi ubrzo posle zamatanja krtola.

Fosfor: standardni savet.

Kalijum: standardni savet.

Tretman semena

Zalamanje klice može imati negativan uticaj na prinos i ujednačenost krupnoće krtola.

Rastojanje u sadnji

28/35 mm: 23 cm (58.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 biljaka/ha)

Korovi

Posle nicanja, standardno korišćenje metribuzina (Sencor) ne daje reakciju na cimi ili smanjenju prinosa.

Fungicidi

Savetuje se preventivno prskanje protiv plamenjače.

Vađenje

Zbog ocene osetljivosti na pojavu modrica na krtolama i/ili oštećenja tokom vađenja, sačekajte sa vađenjem najmanje dva nedelje nakon uništavanja cime.

Temperatura skladištenja - Vreme skladištenja

Poželjna temperatura skladištenja je 4 °C Pogodna za kraće skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus uvijenosti lista: - / -

Virus - Yn: blago osetljiva / 6

Virus - Yntn (na krtolama): blago osetljiva / 7,5

Prskanje: veoma osetljiva / 4

Plamenjača - cima: osetljiva / 5,5

Plamenjača - krtole: blago osetljiva / 6,5

Fusarium: osetljiva / 5

Obična krastavost: osetljiva / 5,5

Prašna krastavost: blago osetljiva / 7,5

Crne pege: osetljiva / 5,5

Rak krompira F1: otporna / 10

Rak krompira F6: - / -

Rak krompira F18: - / -

Zlatne nematode Ro1/4: otporna / 9

Zlatne nematode Ro2/3: - / -

Bele nematode Pa 2: - / -

Bele nematode Pa 3: - / -