ODLINGSREKOMMENDATION

Markies.

High yielding, all-round maincrop variety for French fries, crisping, fast food (QSR market) and fresh consumption.

Industri
Fritering
Chips

Skaleri

- **Stora knölar.**
- **Bra resistenser mot olika typer av cystnematoder.**
- **Bra möjligheter till långlagring.**

Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Korsning: FIANNA x AGRIA
Förädlarrätt: 31-12-2029
Nummersort: MA 85-0698

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 4
Knölform: oval lång / OL
Köttfärg: ljusgul / 6,5
Knölsättning: genomsnittligt / 6
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: under genomsnittlig / 6,5
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: tålig / 8
Ljus groddens färg: blå-violett / BV
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7
Skalfinish: bra / 7
Groningsvila: genomsnittligt / 6,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 427
Koktyp: mjölig / BC
Groningsvila: genomsnittligt / 6,5
Mekaniska skador: känslig / 5
Bentazon: ganska känslig / 6
Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6
Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: något känslig / 7
Stöttblått (inre blåmärken): något till inte känslig / 8
Torrsubstanshalt: 22,8%
Fördelning av torrsubstans: bra / 7,5
TGA-nivå: 3,4 mg/100g
Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6
Friterings kvalitet: utmärkt / 8
Chips kvalitet: bra / 7
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Agrico har gjort alla rimliga ansträngningar för att ta fram denna sortbeskrivning. Observera dock att all information kan komma att ändras och Agrico tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Agrico kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av eller i samband med informationen i denna beskrivning.

AGRICO | NORDIC

ODLINGSREKOMMENDATION

Odlingsråd

Gödsling [1]

Kväve: standardgiva - 10 %.Helst i tre omgånger, med den andra gödslingen strax efter knölbildningen.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgroddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen.Föredras att avgroddas en gång.

Sättavstånd

28/35 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 plants/ha)

[1] Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad, men sällan någon minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Ett förebyggande sprutschema mot bladmögel rekommenderas.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 ºC. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 ºC. Lämplig för medellång lagring.

Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Bladmögel: något mottaglig / 6,5
Brunröta: något mottaglig / 7
Vanlig skorv: mottaglig / 5
Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9
Gul nematod Ro 2/3: - / -
Vit nematod Pa 2: - / -
Vit nematod Pa 3: - / -
Pulverskorv: mycket mottaglig / 3,5
Fusarium: något till inte mottaglig / 8
Bakterios: mottaglig / 5

Svartpricksjuka: - / -
Rost: mycket mottaglig / 4
Virus - Bladrull: något mottaglig / 7
Virus - A: något till inte mottaglig / 8
Virus - X: något till inte mottaglig / 8
Virus - Yn: något mottaglig / 7,5
Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7
Potatiskräfta ras 1: - / -
Potatiskräfta ras 6: ganska mottaglig / 5
Potatiskräfta ras 18: - / -

Agrico Nordic • Kompanigatan 1-2 • 553 05 Jönköping • Sverige
+46 36 372040 info@agriconordic.com www.agricopotatoes.se

AGRICO | NORDIC