

Sidney.

Medelsen industri sort med vit köttfärg,
lämplig för pommes tillverkning.



Industri
Fritering

- ▶ **Stora knölar för långa pommes**
- ▶ **Bra resistenser mot virus**
- ▶ **Lång groningsvila**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.

Korsning: LADY ANNA x AR 05-3392

Nummersort: AR 12-1680

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6

Knölform: lång oval / LO

Köttfärg: vit / 4,5

Knölsättning: genomsnittligt / 6

Knölstorlek: ganska stora / 7,5

Skalfärg: gul / Y

Blomfärg: vit / W

Antal bär: - / -

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7

Blast - slutlig utveckling: ganska tidig / 7,5

Blast - renshet: genomsnittlig / 6,5

Blast - styrka: ganska tålig / 7,5

Ljus groddens färg: - / -

Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5

Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5

Skalfinish: ganska dålig / 5

Groningsvila: genomsnittligt / 6,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 396

Koktyp: något mjölig / B

Groningsvila: genomsnittligt / 6,5

Mekaniska skador: något känslig / 7

Bentazon: - / -

Etylen: 5 % färre till 5 % fler knölar / 5

Återväxt: ganska känslig / 6,5

Växtsprickor: ganska känslig / 6

Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7,5

Torrsubstanshalt: 21,5%

Fördelning av torrsubstans: utmärkt / 8,5

TGA-nivå: 4.3

Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7,5

Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7

Friterings kvalitet: över genomsnittet / 6,5

Chips kvalitet: - / -

Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Odlingsråd

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Att ta bort groddar kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 plants/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 °C. Lämplig för medellång lagring.



Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4

Brunröta: något till inte mottaglig / 8

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: mottaglig / 4

Vit nematod Pa 2: fältresistent / 8

Vit nematod Pa 3: något mottaglig / 6

Pulverskorv: något mottaglig / 6

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: mottaglig / 5,5

Rost: något till inte mottaglig / 8

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7,5

Potatiskräfta ras 1: mycket mottaglig* / 1*

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -