ODLINGSREKOMMENDATION

Arielle.

En tidig till medeltidig färskpotatis med ett tilltalande utseende som väl lämpar sig för tvättning, skalning och paketering.

Matpotatis
Pack
Färskpotatis

- **Tidig**
- **Snygg presentation**
- **Lätt att odla**

Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: NICOLA x AR 73-021-27
Förädlarrätt: 31-12-2031
Nummersort:

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: tidig / 7,5
Knölform: oval / O
Köttfärg: ljusgul / 6
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Blast - inledande utveckling: snabb / 8
Blast - rensbarhet: ganska lätt / 7
Blast - styrka: genomsnittlig / 6
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7,5
Skalfinish: genomsnittlig / 6
Groningsvila: genomsnittligt / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 339
Koktyp: ganska fast / AB
Groningsvila: genomsnittligt / 6
Återväxt: något känslig / 7
Växtsprickor: något känslig / 7
Stöttblått (inre blåmärken): något känslig / 7,5
Torrsubstanshalt: 18,7%
TGA-nivå:
Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6,5
Grå missfärgning (efter kokning): mycket känslig / 4,5
Friterings kvalitet: olämpligt / 4,5
Chips kvalitet: olämpligt / 4

Agrico har gjort alla rimliga ansträngningar för att ta fram denna sortbeskrivning. Observera dock att all information kan komma att ändras och Agrico tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Agrico kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av eller i samband med informationen i denna beskrivning.

AGRICO | NORDIC

ODLINGSREKOMMENDATION

Odlingsråd

Gödsling [1]

Kväve: standardgiva - 25 %.
Fosfat: standardgiva.
Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

-

Sättavstånd

30/35 mm: 19 cm (70.000 plantor/ha)
35/50 mm: 22 cm (57.000 plantor/ha)

Ogräs

Metribuzin (Sencor) poäng är ännu inte fastställda.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 4 ºC. Lämplig för medellång lagring.

[1] Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4
Brunröta: något mottaglig / 6
Vanlig skorv: mottaglig / 5,5
Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9
Pulverskorv: något mottaglig / 6,5
Fusarium: något mottaglig / 7
Svartpricksjuka: mottaglig / 5,5
Rost: något mottaglig / 6,5
Virus - Yn: något mottaglig / 6
Virus - Yntn (knöl): mycket mottaglig / 4
Potatiskräfta ras 1: måttligt mottaglig / 8

Agrico Nordic • Kompanigatan 1-2 • 553 05 Jönköping • Sverige
+46 36 372040 info@agriconordic.com www.agricopotatoes.se

AGRICO | NORDIC