

Fyone.

Högavkastande stärkelsesort med resistenser mot bladmögel och brunröta.



Industri
Stärkelse

- ▶ **Hög TS-halt**
- ▶ **Hög skörd**
- ▶ **Bra lagringsegenskaper**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: AKV Langholt
Korsning: STAYER x ATHLETE
Förädlarrätt: 31-12-2051
Nummersort: PL 11-0111

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 4
Knölform: rund oval / RO
Köttfärg: ljusgul / 6
Knölsättning: genomsnittligt / 6
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: lila / P
Antal bär: - / -
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: tålig / 8
Ljus groddens färg: - / -
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: ganska dålig / 5
Groningsvila: ganska lång / 7,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 470
Koktyp: något mjölig / B
Groningsvila: ganska lång / 7,5
Mekaniska skador: mycket känslig / 4
Bentazon: - / -
Etylen: - / -
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblätt (inre blåmärken): ganska känslig / 6
Torrsubstanshalt: 25,1%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: 14,9
Missfärgning efter råskalad: - / -
Grå missfärgning (efter kokning): - / -
Friterings kvalitet: - / -
Chips kvalitet: under genomsnittet / 5,5
Karvon-olja: - / -

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning.

Sättavstånd

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plants/ha)

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad, men sällan någon minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för lång lagring.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 8,5

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Gul nematod Ro 1/4: - / -

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: - / -

Fusarium: - / -

Bakterios: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: - / -

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: mottaglig / 5

Virus - Yntn (knöl): - / -

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: mycket mottaglig / 1

Potatiskräfta ras 18: - / -