ODLINGSREKOMMENDATION

Fyone.

Industri
Stärkelse

Högavkastande stärkelsesort med resistenser mot bladmögel och brunröta.

- **Hög TS-halt**
- **Hög skörd**
- **Bra lagringsegenskaper**

Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: AKV Langholt
Korsning: STAYER x ATHLETE
Förädlarrätt: 31-12-2051
Nummersort: PL 11-0111

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 4
Knölform: rund oval / RO
Köttfärg: ljusgul / 6
Knölsättning: genomsnittligt / 6
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: ljuslila / LP
Antal bär: - / -
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: tålig / 8
Ljus groddens färg: - / -
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: ganska dålig / 5
Groningsvila: ganska lång / 7,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 470
Koktyp: något mjölig / B
Groningsvila: ganska lång / 7,5
Mekaniska skador: känslig / 5
Bentazon: - / -
Etylen: - / -
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblått (inre blåmärken): ganska känslig / 6
Torrsubstanshalt: 25,1%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: 14,9 mg/100g
Missfärgning efter råskalad: - / -
Grå missfärgning (efter kokning): - / -
Friterings kvalitet: - / -
Chips kvalitet: under genomsnittet / 5,5
Karvon-olja: - / -

Agrico har gjort alla rimliga ansträngningar för att ta fram denna sortbeskrivning. Observera dock att all information kan komma att ändras och Agrico tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Agrico kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av eller i samband med informationen i denna beskrivning.

AGRICO | NORDIC

ODLINGSREKOMMENDATION

Odlingsråd

Gödsling [1]

Kväve: standardgiva.
Fosfat: standardgiva.
Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylen, helst efter en kort snabb väckning.

Sättavstånd

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plants/ha)

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad, men sällan någon minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 ºC. Lämplig för lång lagring.

[1] Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9
Brunröta: något till inte mottaglig / 8,5
Vanlig skorv: mottaglig / 5,5
Gul nematod Ro 1/4: - / -
Gul nematod Ro 2/3: - / -
Vit nematod Pa 2: - / -
Vit nematod Pa 3: - / -
Pulverskorv: - / -
Fusarium: - / -
Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: - / -
Rost: något mottaglig / 6
Virus - Bladrull: - / -
Virus - A: - / -
Virus - X: - / -
Virus - Yn: mottaglig / 5
Virus - Yntn (knöl): - / -
Potatiskräfta ras 1: resistent / 10
Potatiskräfta ras 6: mycket mottaglig / 1
Potatiskräfta ras 18: - / -

Agrico Nordic • Kompanigatan 1-2 • 553 05 Jönköping • Sverige
+46 36 372040 info@agriconordic.com www.agricopotatoes.se

AGRICO | NORDIC