

Sevilla.

A maincrop variety with good underwater weight, delicious flavour and natural protection against late blight in foliage

- ▶ **Natural protection against late blight**
- ▶ **Low nitrogen requirement**
- ▶ **Good drought tolerance**



Ekologiskt



**Industri
Chips
Fritering**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: N. Vos

Korsning: AGRIA x DOB 1997-507-015

Förädlarrätt: 31-12-2048

Nummersort: VOS 2006-001-001

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 4,5

Knölform: oval / 0

Köttfärg: gul / 7

Knölsättning: ganska hög / 7

Knölstorlek: ganska stora / 7

Skalfärg: gul / Y

Blomfärg: lila / P

Antal bär: - / -

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5

Blast - slutlig utveckling: ganska tidig / 7,5

Blast - styrka: ganska tålig / 7,5

Ljus groddens färg: - / -

Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6

Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5

Skalfinish: under genomsnittlig / 5,5

Groningsvila: lång / 8

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 385

Koktyp: mjölig / C

Groningsvila: lång / 8

Mekaniska skador: mycket känslig / 4

Bentazon: - / -

Etylen: - / -

Återväxt: ganska känslig / 6

Växtsprickor: ganska känslig / 6,5

Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7

Torrsubstanshalt: 21%

Fördelning av torrsubstans: bra / 7

TGA-nivå: -

Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6

Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7,5

Friterings kvalitet: mycket bra / 7,5

Chips kvalitet: - / -

Karvon-olja: - / -

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva - 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

En kort snabb väckning av utsädet, eller en korrekt förgröddning rekommenderas. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

35/55 mm: 28 cm (48.000 plants/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 7 °C. Lämplig för lång lagring.



Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: - / -

Vanlig skorv: mycket mottaglig / 4,5

Gul nematod Ro 1/4: - / -

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: - / -

Fusarium: mottaglig / 5

Bakterios: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: - / -

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: - / -

Virus - Yntn (knöl): - / -

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -