

Leonore.

An early processing variety with early a good yield and dry matter content



Industri
Fritering



Skaleri

- ▶ **Early maturity**
- ▶ **Good virus resistance**
- ▶ **Long oval tubers with nice skin finish**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.

Korsning: EXCELLENCY x AR 06-3754

Nummersort: AR 13-1059

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: tidig / 7,5

Knölform: lång oval / LO

Köttfärg: gul / 7

Knölsättning: genomsnittligt / 6,5

Knölstorlek: ganska stora / 7,5

Skalfärg: gul / Y

Blomfärg: vit / W

Antal bär: ingen / 8

Blast - inledande utveckling: snabb / 8

Blast - slutlig utveckling: tidig / 8

Blast - rensharhet: genomsnittlig / 6,5

Blast - styrka: ganska tålig / 7

Ljus groddens färg: - / -

Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6

Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5

Skalfinish: bra / 7

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 397

Koktyp: mjölig / BC

Groningsvila: genomsnittligt / 6,5

Mekaniska skador: ganska känslig / 6,5

Bentazon: - / -

Etylen: 5 % färre till 5 % fler knölar / 5

Återväxt: ganska känslig / 6,5

Växtsprickor: ganska känslig / 6,5

Stöttblätt (inre blåmärken): något till inte känslig / 8

Torrsubstanshalt: 21,5%

Fördelning av torrsubstans: bra / 7,5

TGA-nivå: 6,7 mg/100g

Missfärgning efter råskalad: mycket känslig / 4,5

Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7

Friterings kvalitet: bra / 7

Chips kvalitet: - / -

Karvon-olja: 5 % färre till 5 % fler knölar / 5

Odlingsråd

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Att ta bort groddar kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 24 cm (55.000 plants/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plants/ha)

Plant Leonore a bit deeper than other varieties to avoid green tubers.

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad, men sällan någon minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 7 °C. Lämplig för leverans direkt från fält eller för korttidslagring.



¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 3,5

Brunröta: mottaglig / 5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: mycket mottaglig / 3

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: mottaglig / 5

Rost: mottaglig / 5,5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 7,5

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 6

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -