ODLINGSREKOMMENDATION


Leonore.

En tidig sort med god avkastning och hög TS halt

Industri
Fritering

Skaleri

- **Ganska tidig**
- **Motståndskraftig mot virus**
- **Långoval I form, passar även till pack med ett vackert skal**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: EXCELLENCY x AR 06-3754
Nummersort: AR 13-1059

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: tidig / 7,5
Knölform: lång oval / LO
Köttfärg: gul / 7
Knölsättning: genomsnittligt / 6,5
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: ingen / 8
Blast - inledande utveckling: snabb / 8
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: ganska tålig / 7
Ljus groddens färg: - / -
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: bra / 7
Groningsvila: genomsnittligt / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 397
Koktyp: mjölig / BC
Groningsvila: genomsnittligt / 6,5
Mekaniska skador: ganska känslig / 6,5
Bentazon: - / -
Etylen: 5 % färre till 5 % fler knölar / 5
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblått (inre blåmärken): något till inte känslig / 8
Torrsubstanshalt: 21,5%
Fördelning av torrsubstans: bra / 7,5
TGA-nivå: 6,7 mg/100g
Missfärgning efter råskalad: mycket känslig / 4,5
Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7
Friterings kvalitet: bra / 7
Chips kvalitet: - / -
Karvon-olja: 5 % färre till 5 % fler knölar / 5

Agrico har gjort alla rimliga ansträngningar för att ta fram denna sortbeskrivning. Observera dock att all information kan komma att ändras och Agrico tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Agrico kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av eller i samband med informationen i denna beskrivning.

AGRICO | NORDIC

ODLINGSREKOMMENDATION

Odlingsråd

Gödsling [1]

Kväve: standardgiva + 10 %.
Fosfat: standardgiva.
Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Att ta bort groddar kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 24 cm (55.000 plants/ha)
35/55 mm: 31 cm (42.000 plants/ha)
Plant Leonore a bit deeper than other varieties to avoid green tubers.

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad, men sällan någon minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 7 °C. Lämplig för leverans direkt från fält eller för korttidslagring.

[1] Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 3,5
Brunröta: mottaglig / 5
Vanlig skorv: något mottaglig / 6
Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9
Gul nematod Ro 2/3: - / -
Vit nematod Pa 2: - / -
Vit nematod Pa 3: - / -
Pulverskorv: mycket mottaglig / 3
Fusarium: något mottaglig / 6
Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: mottaglig / 5
Rost: mottaglig / 5,5
Virus - Bladrull: - / -
Virus - A: - / -
Virus - X: - / -
Virus - Yn: något mottaglig / 7,5
Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 6
Potatiskräfta ras 1: resistent / 10
Potatiskräfta ras 6: - / -
Potatiskräfta ras 18: - / -

Agrico Nordic • Kompanigatan 1-2 • 553 05 Jönköping • Sverige
+46 36 372040 info@agriconordic.com www.agricopotatoes.se

AGRICO | NORDIC