

Sevas.



An early maincrop ware variety with large, oval tubers, good dormancy and good tolerance against bruising

- » **High yield**
- » **Good resistance against virus and scab**
- » **Nice skin finish**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Konst Research B.V.

Korsning: KO 06-1457 x SAVANNA

Förädlarrätt: Kommande

Nummersort: KO 13-2242

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 5,5

Knölform: oval / O

Köttfärg: ljusgul / 6

Knölsättning: ganska låg / 5,5

Knölstorlek: stora / 8

Skalfärg: gul / Y

Blomfärg: vit / W

Antal bär: normalt / 6

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5

Blast - slutlig utveckling: tidig / 8

Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6,5

Blast - styrka: tålig / 8

Ljus groddens färg: - / -

Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5

Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7

Skalfinish: över genomsnittlig / 6,5

Groningsvila: ganska lång / 7,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 350

Koktyp: fast / A

Groningsvila: ganska lång / 7,5

Mekaniska skador: ganska känslig / 6,5

Bentazon: - / -

Etylen: 15-25 % fler knölar / 7

Återväxt: ganska känslig / 6,5

Växtsprickor: ganska känslig / 6,5

Stöttblätt (inre blåmärken): något till inte känslig / 8

Torrsubstanshalt: 19,2%

Fördelning av torrsubstans: - / -

TGA-nivå: 7,4 mg/100g

Missfärgning efter råskalad: - / -

Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6

Friterings kvalitet: genomsnittligt / 6

Chips kvalitet: - / -

Karvon-olja: 25 % fler knölar / 8

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva - 10 %. Företrädesvis som delad gödsling, andra gödslingen strax efter knölbildningen.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Att ta bort groddar mer än två gånger kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 23 cm (58.000 plants/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plants/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Ett förebyggande sprutschema mot bladmögel rekommenderas.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 4 °C. Lämplig för medellång lagring.



Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5,5

Brunröta: något mottaglig / 6

Vanlig skorv: något mottaglig / 6,5

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: - / -

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: - / -

Rost: - / -

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 6,5

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -