ODLINGSREKOMMENDATION

Sevas.

Skaleri

En medeltidig matpotatissort med storfallande, ovala knölar, god lagringsduglighet och god motståndskraft mot stötskador. Koktyp A, fin i skal.

- **Hög skörd**
- **Bra motstånd mot virus och skorv**
- **Ett vackert skal**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Konst Research B.V.
Korsning: KO 06-1457 x SAVANNA
Förädlarrätt: Kommande
Nummersort: KO 13-2242

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 5,5
Knölform: oval / O
Köttfärg: ljusgul / 6
Knölsättning: ganska låg / 5,5
Knölstorlek: stora / 8
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: normalt / 6
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: tålig / 8
Ljus groddens färg: - / -
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7
Skalfinish: över genomsnittlig / 6,5
Groningsvila: ganska lång / 7,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 350
Koktyp: fast / A
Groningsvila: ganska lång / 7,5
Mekaniska skador: ganska känslig / 6,5
Bentazon: - / -
Etylen: 15-25 % fler knölar / 7
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblått (inre blåmärken): något till inte känslig / 8
Torrsubstanshalt: 19,2%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: 7,4 mg/100g
Missfärgning efter råskalad: - / -
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6
Friterings kvalitet: genomsnittligt / 6
Chips kvalitet: - / -
Karvon-olja: 25 % fler knölar / 8

Agrico har gjort alla rimliga ansträngningar för att ta fram denna sortbeskrivning. Observera dock att all information kan komma att ändras och Agrico tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Agrico kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av eller i samband med informationen i denna beskrivning.

AGRICO | NORDIC

ODLINGSREKOMMENDATION

Odlingsråd

Gödsling [1]

Kväve: standardgiva - 10 %.Företrädesvis som delad gödsling, andra gödslingen strax efter knölbildningen.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Att ta bort groddar mer än två gånger kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 23 cm (58.000 plants/ha)
35/55 mm: 31 cm (42.000 plants/ha)

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Ett förebyggande sprutschema mot bladmögel rekommenderas.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 4 ºC. Lämplig för medellång lagring.

[1] Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5,5
Brunröta: något mottaglig / 6
Vanlig skorv: något mottaglig / 6,5
Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9
Gul nematod Ro 2/3: - / -
Vit nematod Pa 2: - / -
Vit nematod Pa 3: - / -
Pulverskorv: - / -
Fusarium: något mottaglig / 6
Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: - / -
Rost: - / -
Virus - Bladrull: - / -
Virus - A: - / -
Virus - X: - / -
Virus - Yn: något mottaglig / 6,5
Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7
Potatiskräfta ras 1: resistent / 10
Potatiskräfta ras 6: - / -
Potatiskräfta ras 18: - / -

Agrico Nordic • Kompanigatan 1-2 • 553 05 Jönköping • Sverige
+46 36 372040 info@agriconordic.com www.agricopotatoes.se

AGRICO | NORDIC