

Aztec Gold.



Ekologiskt



Matpotatis
Delikatess

- Jämnstora knölar
- Passar till många rätter
- Lång groningsvila



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: ARD 04-4433 x ARD 03-2128
Förädlarrätt: 31-12-2051
Nummersort: ARD 10-5206

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 5
Knölform: oval / 0
Köttfärg: orange / 8,5
Knölsättning: genomsnittligt / 6
Knölstorlek: normal / 6,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: över genomsnittlig / 5,5
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7
Blast - slutlig utveckling: ganska tidig / 7,5
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5
Ljus groddens färg: - / -
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6
Skalfinish: över genomsnittlig / 6,5
Groningsvila: lång / 8

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 395
Koktyp: något mjölig / B
Groningsvila: lång / 8
Mekaniska skador: något känslig / 7
Bentazon: - / -
Etylen: 5 % färre knölar / 4
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblätt (inre blåmärken): något till inte känslig / 8
Torrsustanshalt: 21,4%
Fördelning av torrsustans: - / -
TGA-nivå: 1,3
Missfärgning efter råskalad: något till inte känslig / 8
Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7,5
Friterings kvalitet: bra / 7
Chips kvalitet: över genomsnittet / 6,5
Karvon-olja: 5 % färre till 5 % fler knölar / 5

Odlingsråd

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 5 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 20 %.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen.

Sättavstånd

28/35 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 6 °C. Lämplig för lång lagring.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 9

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Gul nematod Ro 1/4: mottaglig* / 4*

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: - / -

Fusarium: mycket mottaglig / 4

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: - / -

Rost: något till inte mottaglig / 8

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: mycket mottaglig / 4

Virus - Yntn (knöl): - / -

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -