

Alouette.

En höstpotatis, mångsidig rödskalig matpotatis med resistens mot bladmögel och brunröta, lämplig för konventionell och ekologisk produktion.



Ekologiskt



Matpotatis
Pack



Skaleri

- ▶ **God tolerans mot stöttblätt**
- ▶ **Lämplig för kokning och hembakade produkter**
- ▶ **God tolerans mot torka**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: AR 02-139-1 x LAURA
Förädlarrätt: 31-12-2044
Nummersort: AR 04-3153

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6
Knölform: oval lång / OL
Köttfärg: gul / 7,5
Knölsättning: genomsnittligt / 6
Knölstorlek: ganska stora / 7
Skalfärg: röd / R
Blomfärg: ljuslila / LP
Antal bär: väldigt många / 4
Blast - inledande utveckling: snabb / 8
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5
Ljus groddens färg: röd-violett / RV
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: bra / 7
Groningsvila: genomsnittligt / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 389
Koktyp: ganska fast / AB
Groningsvila: genomsnittligt / 6
Mekaniska skador: ganska känslig / 6
Bentazon: något känslig / 7
Etylen: 5 % färre knölar / 4
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblätt (inre blåmärken): något till inte känslig / 8
Torrsustanshalt: 21,1%
Fördelning av torrsustans: - / -
TGA-nivå: 3,6
Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7
Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7
Friterings kvalitet: över genomsnittet / 6,5
Chips kvalitet: - / -
Karvon-olja: 5 till 15 % fler knölar / 6

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 20 %.

Behandling av utsäde

Plantera helst knölarna i varm jord, eftersom den här sortens utveckling är långsam i början. En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantor/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 °C. Lämplig för medellång lagring.



Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 9

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: fältresistent / 8

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: något mottaglig / 6,5

Fusarium: något mottaglig / 7,5

Bakterios: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: - / -

Rost: mottaglig / 5,5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: något mottaglig / 7

Virus - Yn: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -