

Babylon.

Maincrop, yellow fleshed processing variety with a good yield and a very stable quality.

- ▶ Utmärkt kvalitet efter frittering.
- ▶ Flertal resistenser mot olika typer av virus.
- ▶ Bra möjligheter till långlagring.



Industri
Fritering
Chips
Skal



Matpotatis
Färskpotatis



Skaleri



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: R.K. Bakker
Korsning: AGRIA MUTANT
Förädlarrätt: 31-12-2046
Nummersort: BA 06-0001

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 5
Knölform: oval lång / OL
Köttfärg: gul / 7
Knölsättning: genomsnittligt / 6
Knölstorlek: stora / 8
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: ingen / 8
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: tålig / 8
Ljus groddens färg: blå-violett / BV
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7
Skalfinish: genomsnittlig / 6
Groningsvila: lång / 8

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 401
Koktyp: mjölig / BC
Groningsvila: lång / 8
Mekaniska skador: känslig / 5,5
Bentazon: något känslig / 7,5
Etylen: 5 % färre till 5 % fler knölar / 5
Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: ganska känslig / 6
Stöttblätt (inre blåmärken): ganska känslig / 6
Torrsustanshalt: 21,7%
Fördelning av torrsustans: bra / 7
TGA-nivå: 5,2
Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7
Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7
Friterings kvalitet: utmärkt / 8
Chips kvalitet: bra / 7
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva - 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Föredras att avgroddas en gång.

Sättavstånd

28/35 mm: 24-26 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 29-32 cm (44.000 plants/ha)

50/55 mm: 37-39 cm (35.000 plants/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad och en viss minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Ett förebyggande sprutschema mot bladmögel rekommenderas.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blstdödnis.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 °C. Lämplig för lång lagring.



Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5,5

Brunröta: något mottaglig / 6,5

Vanlig skorv: mottaglig / 5

Gul nematod Ro 1/4: fältresistent / 8

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: - / -

Fusarium: något mottaglig / 7

Bakterios: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: mycket mottaglig / 4,5

Rost: något mottaglig / 6,5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 7,5

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -