ODLINGSREKOMMENDATION

# Cerisa.

En tidig, liten knöl med rött skal, som är en specialsort för sallad och som har en utmärkt smak.

**Matpotatis**
Sallad

- **Mycket hög knölsättning**
- **Utmärkta smak- och kokegenskaper**
- **Bra virusresistens**

# Egenskaper

## Allmänna egenskaper

**Förädlare:** Desmazières
**Korsning:** FRANCINE x LAURA
**Förädlarrätt:** 31-12-2041
**Nummersort:** DM 99-063-07

## Växtens och knölens egenskaper

**Mognad:** tidig / 7,5
**Knölform:** lång / L
**Köttfärg:** gul / 7
**Knölsättning:** hög / 9
**Knölstorlek:** normal / 6
**Skalfärg:** röd / R
**Blomfärg:** ljuslila / LP
**Antal bär:** väldigt många / 4
**Blast - inledande utveckling:** ganska snabb / 7
**Blast - slutlig utveckling:** medel / 7
**Blast - rensbarhet:** ganska lätt / 7
**Blast - styrka:** ganska ömtålig / 5,5
**Ljus groddens färg:** röd-violett / RV
**Knölens regelbundenhet:** Jämn / 7
**Regelbundenhet i storleken:** Ganska jämn / 6
**Skalfinish:** utmärkt / 8
**Groningsvila:** genomsnittligt / 6

## Känslighet och kvalitet

**Undervattenvikt:** 391
**Koktyp:** fast / A
**Groningsvila:** genomsnittligt / 6
**Mekaniska skador:** något känslig / 7
**Bentazon:** något känslig / 7
**Etylen:** - / -
**Återväxt:** ganska känslig / 6,5
**Växtsprickor:** känslig / 5
**Stöttblått (inre blåmärken):** något känslig / 7
**Torrsubstanshalt:** 21,3%
**Fördelning av torrsubstans:** utmärkt / 8
**TGA-nivå:** 5,5 mg/100g
**Missfärgning efter råskalad:** känslig / 5,5
**Grå missfärgning (efter kokning):** något känslig / 7
**Friterings kvalitet:** olämpligt / 5
**Chips kvalitet:** olämpligt / 4,5
**Karvon-olja:** 5 % färre till 5 % fler knölar / 5

Agrico har gjort alla rimliga ansträngningar för att ta fram denna sortbeskrivning. Observera dock att all information kan komma att ändras och Agrico tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Agrico kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av eller i samband med informationen i denna beskrivning.

AGRICO | NORDIC

ODLINGSREKOMMENDATION

# Odlingsråd

## Gödsling [1]

**Kväve:** standardgiva - 10 %.

**Fosfat:** standardgiva.

**Kalium:** standardgiva.

## Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylen, helst efter en kort snabb väckning.Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

## Sättavstånd

30/50 mm: 20 cm (67.000 plantor/ha)

## Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

## Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

## Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

## Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 4 ºC. Lämplig för medel och lång lagring.

[1] Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Say potato, say Agrico.

## Motståndskraft

**Bladmögel:** mycket mottaglig / 4

**Brunröta:** något mottaglig / 7

**Vanlig skorv:** något mottaglig / 6

**Gul nematod Ro 1/4:** - / -

**Gul nematod Ro 2/3:** - / -

**Vit nematod Pa 2:** - / -

**Vit nematod Pa 3:** - / -

**Pulverskorv:** något mottaglig / 6

**Fusarium:** något mottaglig / 6

**Bakterios:** något mottaglig / 7

**Svartpricksjuka:** något mottaglig / 7

**Rost:** mottaglig / 5

**Virus - Bladrull:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Virus - Yn:** något till inte mottaglig / 8

**Virus - Yntn (knöl):** något mottaglig / 7

**Potatiskräfta ras 1:** - / -

**Potatiskräfta ras 6:** - / -

**Potatiskräfta ras 18:** - / -

Agrico Nordic • Kompanigatan 1-2 • 553 05 Jönköping • Sverige
+46 36 372040 info@agriconordic.com www.agricopotatoes.se

AGRICO | NORDIC