

Cerisa.

En tidig, liten knöl med rött skal, som är en specialsort för sallad och som har en utmärkt smak.



Matpotatis
Sallad

- » **Mycket hög knölsättning**
- » **Utmärkta smak- och kokegenskaper**
- » **Bra virusresistens**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Desmazières

Korsning: FRANCINE x LAURA

Förädlarrätt: 31-12-2041

Nummersort: DM 99-063-07

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: tidig / 7,5

Knölform: lång / L

Köttfärg: gul / 7

Knölsättning: hög / 9

Knölstorlek: normal / 6

Skalfärg: röd / R

Blomfärg: ljuslila / LP

Antal bär: väldigt många / 4

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7

Blast - slutlig utveckling: medel / 7

Blast - renbarhet: ganska lätt / 7

Blast - styrka: ganska ömtålig / 5,5

Ljus groddens färg: röd-violett / RV

Knölens regelbundenhet: Jämn / 7

Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6

Skalfinish: utmärkt / 8

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 391

Koktyp: fast / A

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Mekaniska skador: något känslig / 7

Bentazon: något känslig / 7

Etylen: - / -

Återväxt: ganska känslig / 6,5

Växtsprickor: känslig / 5

Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7

Torrsubstanshalt: 21,3%

Fördelning av torrsubstans: utmärkt / 8

TGA-nivå: 5,5

Missfärgning efter råskalad: känslig / 5,5

Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7

Friterings kvalitet: olämpligt / 5

Chips kvalitet: olämpligt / 4,5

Karvon-olja: 5 % färre till 5 % fler knölar / 5

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva - 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

30/50 mm: 20 cm (67.000 plantor/ha)

Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 4 °C. Lämplig för medel och lång lagring.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4

Brunröta: något mottaglig / 7

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: - / -

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: något mottaglig / 6

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: något mottaglig / 7

Svartpricksjuka: något mottaglig / 7

Rost: mottaglig / 5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -