

Chateau.

En tidig salladssort med bra knölsättning och ganska bra TS-halt.



Matpotatis
Delikatess
Sallad

- ▶ **Utmärkt skalkvalitet**
- ▶ **Officiell registrering som "chair ferme"**
- ▶ **Hög knölsättning**



characteristics

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: MA 98-0322 x AR 98-0341
Förädlarrätt: 31-12-2046
Nummersort: AR 05-1443

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: tidig / 7,5
Knölform: lång oval / LO
Köttfärg: ljusgul / 6,5
Knölsättning: hög / 8
Knölstorlek: ganska stora / 7
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: över genomsnittlig / 5,5
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: ganska lätt / 7
Blast - styrka: ganska tålig / 7
Ljus groddens färg: blå-violett / BV
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7
Skalfinish: bra / 7
Groningsvila: genomsnittligt / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 350
Koktyp: ganska fast / AB
Groningsvila: genomsnittligt / 6
Mekaniska skador: känslig / 5
Bentazon: något känslig / 7,5
Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblätt (inre blåmärken): något till inte känslig / 8
Torrsustanshalt: 19,2%
Fördelning av torrsustans: - / -
TGA-nivå: 4,2
Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7,5
Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7,5
Friterings kvalitet: olämpligt / 4
Chips kvalitet: olämpligt / 4
Karvon-olja: 5 till 15 % fler knölar / 6

How to grow

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 20 %.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planting distance

30/40 mm: 23 cm (58.000 plantor/ha)

40/50 mm: 26 cm (51.500 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad och en viss minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato,
say Agrico.

Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4

Brunröta: mottaglig / 5,5

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: mycket mottaglig / 2

Fusarium: något mottaglig / 7

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: mycket mottaglig / 4,5

Rost: mottaglig / 5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 7

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 6,5

Potatiskräfta ras 1: måttligt mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -