

Palace.

Maincrop, high yielding processing variety for the French fries industry which is suitable for different soil types.

- » **Hög TS-halt.**
- » **Stora knölar.**
- » **Bra skin finish.**



Industri
Fritering
Flingor



Matpotatis
Färsipotatis



Skaleri



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: AR 01-3350 x ADD 93-20902
Förädlarrätt: 31-12-2049
Nummersort: AR 08-4241

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 4,5
Knölform: oval / 0
Köttfärg: ljusgul / 6
Knölsättning: genomsnittligt / 6
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: lila / P
Antal bär: väldigt många / 4
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5
Ljus groddens färg: grön-röd / GR
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: genomsnittlig / 6
Groningsvila: ganska kort / 5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 430
Koktyp: mjölig / C
Groningsvila: ganska kort / 5
Mekaniska skador: känslig / 5
Bentazon: - / -
Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6
Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblätt (inre blåmärken): ganska känslig / 6
Torrsustanshalt: 23,2%
Fördelning av torrsustans: genomsnittlig / 6
TGA-nivå: 13,1
Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6
Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7
Friterings kvalitet: utmärkt / 8
Chips kvalitet: genomsnittligt / 6
Karvon-olja: 25 % fler knölar / 8

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva - 25 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 25 %.

Behandling av utsäde

Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken. En kort snabb väckning av utsädet, eller en korrekt förgröddning rekommenderas.

Sättavstånd

28/35 mm: 24-27 cm (50.000 plants/ha)

35/50 mm: 32-35 cm (40.000 plants/ha)

50/55 mm: 38-40 cm (33.000 plants/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad, men sällan någon minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 °C. Lämplig för medel och lång lagring.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5

Brunröta: något mottaglig / 6,5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: - / -

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: mottaglig / 2

Vit nematod Pa 3: mottaglig / 2

Pulverskorv: något mottaglig / 7,5

Fusarium: mottaglig / 5,5

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: mottaglig / 5

Rost: mottaglig / 5,5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 7,5

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 6

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -