

Rudolph.

En medelsen matpotatisort med attraktivt rött skal, bra värmeterans och mycket hög avkastning.



**Matpotatis
Pack**

- ▶ **Vit köttfärg**
- ▶ **Stora knölar**
- ▶ **Bra lagringsduglighet**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: CHIEFTAIN x STIRLING
Förädlarrätt: 31-12-2035
Nummersort: UK 93-1-2

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 5,5
Knölform: oval rund / OR
Köttfärg: vit / 4
Knölsättning: ganska låg / 5
Knölstorlek: stora / 8
Skalfärg: röd / R
Blomfärg: ljuslila / LP
Antal bär: normalt / 6
Blast - inledande utveckling: normal / 6
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: tålig / 8
Ljus groddens färg: röd-violett / RV
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7
Skalfinish: bra / 7
Groningsvila: ganska lång / 7

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 376
Koktyp: ganska fast / AB
Groningsvila: ganska lång / 7,5
Mekaniska skador: ganska känslig / 6
Bentazon: - / -
Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6
Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7
Torrsustanshalt: 20,5%
Fördelning av torrsustans: - / -
TGA-nivå: 5,5
Missfärgning efter råskalad: - / -
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5
Friterings kvalitet: över genomsnittet / 6,5
Chips kvalitet: under genomsnittet / 5,5
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 5 %. Företrädesvis som delad gödsling, andra gödslingen strax efter knölbildningen.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

Behandling av utsäde

En kort snabb väckning av utsädet, eller en korrekt förgröddning rekommenderas. En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Föredras att avgroddas en gång.

Sättavstånd

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad och en viss minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 °C. Lämplig för lång lagring.



Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5,5

Brunröta: mottaglig / 5,5

Vanlig skorv: mottaglig / 5

Gul nematod Ro 1/4: - / -

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: något mottaglig / 7

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: något mottaglig / 6

Say potato,
say Agrico.

Svartpricksjuka: något mottaglig / 7

Rost: något mottaglig / 7

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: något mottaglig / 6

Virus - Yn: mottaglig / 5

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: måttligt mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 18: - / -