

Twister.

En tidig sort för konventionell och ekologisk odling med god avkastning och resistent mot bladmögel och brunröta.

- » Vackert utseende
- » Bra lagringsduglighet
- » Fast kokande



Ekologiskt



Matpotatis
Pack
Färskpotatis



Skaleri



characteristics

Allmänna egenskaper

Förädlare: G.W. te Winkel
Korsning: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Förädlarrätt: 31-12-2048
Nummersort: TW 08-1507

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medeltidig / 7
Knölform: rund oval / RO
Köttfärg: ljusgul / 6,5
Knölsättning: genomsnittligt / 6,5
Knölstorlek: ganska stora / 7
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: ljuslila / LP
Antal bär: över genomsnittlig / 5,5
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7
Blast - slutlig utveckling: ganska tidig / 7,5
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: ganska tålig / 7
Ljus groddens färg: röd-violett / RV
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: bra / 7
Groningsvila: ganska lång / 7

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 345
Koktyp: ganska fast / AB
Groningsvila: ganska lång / 7
Mekaniska skador: något känslig / 7
Bentazon: ganska känslig / 6
Etylen: 5 % färre knölar / 4
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblätt (inre blåmärken): något till inte känslig / 8
Torrsustanshalt: 19%
Fördelning av torrsustans: - / -
TGA-nivå: 5,63
Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5
Friterings kvalitet: olämpligt / 5
Chips kvalitet: olämpligt / 4
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

How to grow

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 20 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Föredras att avgroddas en gång.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantor/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 6 °C. Lämplig för medel och lång lagring.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 9

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: mottaglig / 5

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: något mottaglig / 7

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 1: måttligt mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -