

Jolene.

An early maincrop variety with a good skin finish and suitable for home frying


- ▶ **Light yellow flesh colour**
- ▶ **Suitable for different dishes**
- ▶ **Good dry matter content**



Matpotatis
Färskpotatis



Skaleri



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: SAGITTA x AR 03-1491
Förädlarrätt: 31-12-2050
Nummersort: AR 09-2556

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6
Knölform: oval lång / OL
Köttfärg: ljusgul / 6
Knölsättning: ganska hög / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: under genomsnittlig / 7
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5
Ljus groddens färg: röd / R
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7
Skalfinish: bra / 7
Groningsvila: genomsnittligt / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 389
Koktyp: något mjölig / B
Groningsvila: genomsnittligt / 6
Mekaniska skador: ganska känslig / 6
Bentazon: - / -
Etylen: 15-25 % fler knölar / 7
Återväxt: något känslig / 7
Växtsprickor: något känslig / 7
Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7
Torrsustanshalt: 21,1%
Fördelning av torrsustans: - / -
TGA-nivå: 6,9 mg/100g
Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5
Friterings kvalitet: bra / 7
Chips kvalitet: olämpligt / 5
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 22 cm (60.500 plants/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad och en viss minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blstdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.



Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4

Brunröta: mottaglig / 5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: - / -

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: något mottaglig / 6,5

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: något mottaglig / 7,5

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -