

Sinora.

Medeltidig, högavkastande och lättodlade sort för tidig pommes- eller chips.



Industri
Fritering
Chips

- ▶ **Tidig leverans direkt från fält**
- ▶ **Hög TS-halt**
- ▶ **Bra virusresistens**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: J. Schilt

Korsning: AGRIA x AM 70-2166

Förädlarrätt: 31-12-2027

Nummersort: SI 85-0482

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medeltidig / 7

Knölform: oval rund / OR

Köttfärg: ljusgul / 6,5

Knölsättning: ganska hög / 7

Knölstorlek: ganska stora / 7

Skalfärg: gul / Y

Blomfärg: vit / W

Antal bär: väldigt många / 4

Blast - inledande utveckling: snabb / 8

Blast - slutlig utveckling: tidig / 8

Blast - renbarhet: ganska lätt / 7

Blast - styrka: ganska tålig / 7,5

Ljus groddens färg: blå-violett / BV

Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6

Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7

Skalfinish: genomsnittlig / 6

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 416

Koktyp: något mjölig / B

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Mekaniska skador: mycket känslig / 4,5

Bentazon: ganska känslig / 6,5

Etylen: - / -

Återväxt: ganska känslig / 6,5

Växtsprickor: ganska känslig / 6,5

Stöttblätt (inre blåmärken): ganska känslig / 6,5

Torrsubstanshalt: 22,6%

Fördelning av torrsubstans: bra / 7

TGA-nivå: 8,2

Missfärgning efter råskalad: känslig / 5

Grå missfärgning (efter kokning): känslig / 5

Friterings kvalitet: mycket bra / 7,5

Chips kvalitet: bra / 7

Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Odlingsråd

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 25 %.Användning av stallgödsel är inte att rekommendera.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Att ta bort groddar mer än två gånger kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 °C. Lämplig för leverans direkt från fält eller för korttidslagring.



Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4,5

Brunröta: mottaglig / 5

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: mottaglig / 4

Vit nematod Pa 3: mottaglig / 2

Pulverskorv: mottaglig / 5

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: något mottaglig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: - / -

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: något mottaglig / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: något till inte mottaglig / 8,5

Virus - Yn: något mottaglig / 7

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -