

Adato.

Höstpottatis med ganska stora knölar och ganska hög TS-halt.




**Matpotatis
Pack**



Skaleri

- ▶ **Bra skalkkvalitet**
- ▶ **God tolerans mot torka**
- ▶ **Lämplig för kokning och hembakade produkter**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Lantmännen Seed B.V.
Korsning: NICOLA x RED BARON
Förädlarrätt: 31-12-2046
Nummersort: SW 04-0087

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6
Knölform: oval lång / OL
Köttfärg: ljusgul / 5,5
Knölsättning: ganska hög / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: under genomsnittlig / 6,5
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6
Blast - styrka: tålig / 8
Ljus groddens färg: röd-violett / RV
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: mycket bra / 7,5
Groningsvila: ganska kort / 5,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 374
Koktyp: mjölig / BC
Groningsvila: ganska kort / 5,5
Mekaniska skador: ganska känslig / 6
Bentazon: något till inte känslig / 8
Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblått (inre blåmärken): ganska känslig / 6,5
Torrsubstanshalt: 20,4%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: 4,56
Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5
Friterings kvalitet: över genomsnittet / 6,5
Chips kvalitet: genomsnittligt / 6
Karvon-olja: 5 till 15 % fler knölar / 6

Odlingsråd

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 20 %. Företrädesvis som delad gödsling, andra gödslingen strax efter knölbildningen.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Föredras att avgroddas en gång.

Sättavstånd

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantor/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5

Brunröta: något mottaglig / 7,5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: mycket mottaglig / 2

Fusarium: något mottaglig / 6,5

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: mottaglig / 5

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 6,5

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 6

Potatiskräfta ras 1: något mottaglig / 9

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -