

Ailstar.



Industri
Stärkelse

Sen stärkelsesort med god stärkelsehalt och motståndskraftig mot olika typer av potatiskräfta.

- » **Ganska stora knölar**
- » **Hög TS-halt**
- » **Flera resistenser**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: J.L. Spijckman

Korsning: KURAS x SERESTA

Förädlarrätt: 31-12-2045

Nummersort: SA 05-0204

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 4,5

Knölform: rund oval / RO

Köttfärg: ljusgul / 5

Knölsättning: ganska hög / 7

Knölstorlek: ganska stora / 7

Skalfärg: gul / Y

Blomfärg: vit / W

Antal bär: väldigt många / 4

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7

Blast - slutlig utveckling: tidig / 8

Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6

Blast - styrka: ganska tålig / 7

Ljus groddens färg: blå-violett / BV

Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6

Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6

Skalfinish: ganska dålig / 5

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 508

Koktyp: mjölig / C

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Mekaniska skador: känslig / 5

Bentazon: något till inte känslig / 8

Etylen: 15-25 % fler knölar / 7

Återväxt: ganska känslig / 6

Växtsprickor: något känslig / 7

Stöttblätt (inre blåmärken): mycket känslig / 4

Torrsubstanshalt: 27%

Fördelning av torrsubstans: - / -

TGA-nivå: 10,1

Missfärgning efter råskalad: - / -

Grå missfärgning (efter kokning): mycket känslig / 4

Friterings kvalitet: olämpligt / 4

Chips kvalitet: olämpligt / 5

Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Odlingsråd

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 5 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 20 %.

Behandling av utsäde

En kort snabb väckning av utsädet, eller en korrekt förgröddning rekommenderas. En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Föredras att avgroddas en gång.

Sättavstånd

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantor/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantor/ha)

Allstar har långa stoloner, så plantera sorten inte för djupt.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Ett förebyggande sprutschema mot bladmögel rekommenderas.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blstdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: något mottaglig / 6

Brunröta: något mottaglig / 6,5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: mottaglig / 4

Vit nematod Pa 2: något mottaglig / 6

Vit nematod Pa 3: mottaglig / 4

Pulverskorv: något till inte mottaglig / 8

Fusarium: - / -

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: - / -

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: mottaglig / 5,5

Virus - Yn: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 9

Potatiskräfta ras 1: något mottaglig / 9

Potatiskräfta ras 6: resistent / 10

Potatiskräfta ras 18: något mottaglig / 9