ODLINGSREKOMMENDATION

# Ardeche.

En tidig stärkelsesort med god avkastning, motståndskraftig mot bladmögel och brunröta. Passande för industriproduktion.

- **Bra TS-halter**
- **Flera resistenser mot potatiscystnematoder**
- **Bra virusresistens**

**Ekologiskt**

**Industri**
Flingor
Stärkelse




# Egenskaper

## Allmänna egenskaper

**Förädlare:** Agrico Research B.V.
**Korsning:** STAYER x AR 02-2139
**Förädlarrätt:** 31-12-2048
**Nummersort:** AR 07-2451

## Växtens och knölens egenskaper

**Mognad:** medelsen / 5,5
**Knölform:** rund oval / RO
**Köttfärg:** ljusgul / 6,5
**Knölsättning:** ganska låg / 5
**Knölstorlek:** ganska stora / 7,5
**Skalfärg:** gul / Y
**Blomfärg:** vit / W
**Antal bär:** normalt / 6
**Blast - inledande utveckling:** snabb / 8
**Blast - slutlig utveckling:** tidig / 8
**Blast - rensbarhet:** genomsnittlig / 6,5
**Blast - styrka:** ganska tålig / 7,5
**Ljus groddens färg:** grön-röd / GR
**Knölens regelbundenhet:** Ganska jämn / 6,5
**Regelbundenhet i storleken:** Jämn / 7
**Skalfinish:** mycket dålig / 4
**Groningsvila:** ganska kort / 5,5

## Känslighet och kvalitet

**Undervattenvikt:** 474
**Koktyp:** mjölig / C
**Groningsvila:** ganska kort / 5,5
**Mekaniska skador:** ganska känslig / 6
**Bentazon:** något till inte känslig / 8
**Etylen:** 15-25 % fler knölar / 7
**Återväxt:** ganska känslig / 6
**Växtsprickor:** ganska känslig / 6
**Stöttblått (inre blåmärken):** mycket känslig / 4,5
**Torrsubstanshalt:** 25,3%
**Fördelning av torrsubstans:** - / -
**TGA-nivå:** 4,7 mg/100g
**Missfärgning efter råskalad:** - / -
**Grå missfärgning (efter kokning):** ganska känslig / 6,5
**Friterings kvalitet:** olämpligt / 4
**Chips kvalitet:** genomsnittligt / 6
**Karvon-olja:** 5 % färre knölar / 4

Agrico har gjort alla rimliga ansträngningar för att ta fram denna sortbeskrivning. Observera dock att all information kan komma att ändras och Agrico tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Agrico kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av eller i samband med informationen i denna beskrivning.

AGRICO | NORDIC

ODLINGSREKOMMENDATION

# Odlingsråd

## Gödsling [1]

**Kväve:** standardgiva + 10 %.
**Fosfat:** standardgiva.
**Kalium:** standardgiva + 20 %.

## Behandling av utsäde

En ordentlig förgroddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen.Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

## Sättavstånd

28/35 mm: 21 cm (64.000 plantor/ha)
35/55 mm: 26 cm (50.000 plantor/ha)

## Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

## Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

## Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

## Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 8 ºC. Lämplig för medellång lagring.

[1] Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato, say Agrico.

## Motståndskraft

**Bladmögel:** något till inte mottaglig / 9
**Brunröta:** något till inte mottaglig / 9
**Vanlig skorv:** något mottaglig / 6
**Gul nematod Ro 1/4:** resistent / 9
**Gul nematod Ro 2/3:** resistent / 9
**Vit nematod Pa 2:** resistent / 9
**Vit nematod Pa 3:** fältresistent / 7
**Pulverskorv:** något mottaglig / 6,5
**Fusarium:** - / -
**Bakterios:** - / -

**Svartpricksjuka:** något mottaglig / 7
**Rost:** något mottaglig / 6
**Virus - Bladrull:** - / -
**Virus - A:** - / -
**Virus - X:** - / -
**Virus - Yn:** något mottaglig / 6
**Virus - Yntn (knöl):** något till inte mottaglig / 8,5
**Potatiskräfta ras 1:** måttligt mottaglig / 8
**Potatiskräfta ras 6:** måttligt mottaglig / 8
**Potatiskräfta ras 18:** - / -

Agrico Nordic • Kompanigatan 1-2 • 553 05 Jönköping • Sverige
+46 36 372040 info@agriconordic.com www.agricopotatoes.se

AGRICO | NORDIC