

Ardeche.

En tidig stärkelsesort med god avkastning, motståndskraftig mot bladmögel och brunröta. Passande för industriproduktion.

- ▶ **Bra TS-halter**
- ▶ **Flera resistenser mot potatiscystnematoder**
- ▶ **Bra virusresistens**



Ekologiskt



Industri
Flingor
Stärkelse



characteristics

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: STAYER x AR 02-2139
Förädlarrätt: 31-12-2048
Nummersort: AR 07-2451

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 5,5
Knölform: rund oval / RO
Köttfärg: ljusgul / 6,5
Knölsättning: ganska låg / 5
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: normalt / 6
Blast - inledande utveckling: snabb / 8
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5
Ljus groddens färg: grön-röd / GR
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7
Skalfinish: mycket dålig / 4
Groningsvila: ganska kort / 5,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 474
Koktyp: mjölig / C
Groningsvila: ganska kort / 5,5
Mekaniska skador: ganska känslig / 6
Bentazon: något till inte känslig / 8
Etylen: 15-25 % fler knölar / 7
Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: ganska känslig / 6
Stöttblätt (inre blåmärken): mycket känslig / 4,5
Torrsustanshalt: 25,3%
Fördelning av torrsustans: - / -
TGA-nivå: 4,7
Missfärgning efter råskalad: - / -
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5
Friterings kvalitet: olämpligt / 4
Chips kvalitet: genomsnittligt / 6
Karvon-olja: 5 % färre knölar / 4

How to grow

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 20 %.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planting distance

28/35 mm: 21 cm (64.000 plantor/ha)

35/55 mm: 26 cm (50.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 8 °C. Lämplig för medellång lagring.



Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 9

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: resistent / 9

Vit nematod Pa 2: resistent / 9

Vit nematod Pa 3: fältresistent / 7

Pulverskorv: något mottaglig / 6,5

Fusarium: - / -

Bakterios: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: något mottaglig / 7

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 6

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 8,5

Potatiskräfta ras 1: måttligt mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 6: måttligt mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 18: - / -