


Arrow.

Färskpotatissort med ett mycket attraktivt skal som kan odlas på olika typer av jordar.

- » **Krämig köttfärg**
- » **Ovala långa knölar**
- » **God tolerans mot torka**



Matpotatis
Färskpotatis
Pack



Skaleri

Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: SOLARA x FRESCO
Förädlarrätt: 31-12-2034
Nummersort: AR 93-0084

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: mycket tidig / 8
Knölform: oval lång / OL
Köttfärg: ljusgul / 5
Knölsättning: ganska låg / 5
Knölstorlek: stora / 8
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: väldigt många / 4
Blast - inledande utveckling: normal / 6,5
Blast - slutlig utveckling: medel / 7
Blast - renbarhet: ganska lätt / 7
Blast - styrka: genomsnittlig / 6
Ljus groddens färg: - / -
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: utmärkt / 8
Groningsvila: ganska kort / 5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 355
Koktyp: ganska fast / AB
Groningsvila: ganska kort / 5
Mekaniska skador: ganska känslig / 6
Bentazon: - / -
Etylen: 15-25 % fler knölar / 7
Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7
Torrsubstanshalt: 19,5%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: 2,8
Missfärgning efter råskalad: - / -
Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7
Friterings kvalitet: olämpligt / 4
Chips kvalitet: olämpligt / 4
Karvon-olja: 5 till 15 % fler knölar / 6

Odlingsråd

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 10 %.Företädesvis som delad gödsling, andra gödslingen strax efter knölbildningen.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantor/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) en allvarlig reaktion på blad och en viss minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för leverans direkt från fält eller för korttidslagring.



Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4

Brunröta: något mottaglig / 7

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: mottaglig / 5

Fusarium: mottaglig / 5

Bakterios: mottaglig / 5

Say potato,
say Agrico.

Svartpricksjuka: något mottaglig / 7,5

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: något mottaglig / 7

Virus - Yn: mottaglig / 5,5

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7,5

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -