

Beyonce.

En medelsen chipssort med god torrsubstanshalt för medellång lagring och är motståndskraftig mot blad och knölar.

- **Stora knölar**
- **Lång groningsvila**
- **Ganska hög knölsättning**



Ekologiskt



Industri
Chips
Flingor



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: AR 94-2061 x LADY JO
Förädlarrätt: 31-12-2049
Nummersort: AR 08-3271

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6
Knölform: oval rund / OR
Köttfärg: ljusgul / 6,5
Knölsättning: ganska hög / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: lila / P
Antal bär: väldigt många / 4
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5
Ljus groddens färg: blå-violett / BV
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7
Skalfinish: under genomsnittlig / 5,5
Groningsvila: ganska lång / 7

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 446
Koktyp: mjölig / BC
Groningsvila: ganska lång / 7
Mekaniska skador: ganska känslig / 6
Bentazon: något till inte känslig / 8
Etylen: 5 % färre till 5 % fler knölar / 5
Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7,5
Torrsubstanshalt: 23,9%
Fördelning av torrsubstans: genomsnittlig / 6,5
TGA-nivå: 6,5
Missfärgning efter råskalad: något till inte känslig / 8
Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7
Friterings kvalitet: bra / 7
Chips kvalitet: utmärkt / 8
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Odlingsråd

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 25 %.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantor/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

För industri ändamål får den helst inte förvaras under 9 °C. Lämplig för medellång lagring.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 8,5

Brunröta: något mottaglig / 7,5

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Gul nematod Ro 1/4: mottaglig / 4

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: något mottaglig / 6

Fusarium: något mottaglig / 7,5

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: något mottaglig / 7,5

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: mottaglig / 5,5

Virus - Yntn (knöl): mottaglig / 5

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -