ODLINGSREKOMMENDATION

Carolus.

Ekologiskt | Matpotatis Pack | Skaleri

En medelsen, mångsidig matpotatissort med attraktiva röda ögon och resistenser mot bladmögel och brunröta.

- **Mångsidig sort**
- **Hög torrsubstanshalt**
- **Mjölig**

Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: AGRIA x AR 00-94-17
Förädlarrätt: 31-12-2043
Nummersort: AR 02-3225

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6
Knölform: oval / O
Köttfärg: gul / 7
Knölsättning: genomsnittligt / 6
Knölstorlek: ganska stora / 7
Skalfärg: gul med röda ögon / Y/R
Blomfärg: lila / P
Antal bär: väldigt många / 4
Blast - inledande utveckling: normal / 6
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: tålig / 8
Ljus groddens färg: blå-violett / BV
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7
Skalfinish: bra / 7
Groningsvila: genomsnittligt / 6,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 398
Koktyp: mjölig / BC
Groningsvila: genomsnittligt / 6,5
Mekaniska skador: känslig / 5,5
Bentazon: ganska känslig / 6
Etylen: 15-25 % fler knölar / 7
Återväxt: något känslig / 7
Växtsprickor: känslig / 5,5
Stöttblått (inre blåmärken): ganska känslig / 6
Torrsubstanshalt: 21,6%
Fördelning av torrsubstans: utmärkt / 8
TGA-nivå: 5,4 mg/100g
Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6
Friterings kvalitet: bra / 7
Chips kvalitet: bra / 7
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Agrico har gjort alla rimliga ansträngningar för att ta fram denna sortbeskrivning. Observera dock att all information kan komma att ändras och Agrico tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Agrico kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av eller i samband med informationen i denna beskrivning.

AGRICO | NORDIC

ODLINGSREKOMMENDATION

Odlingsråd

Gödsling [1]

Kväve: standardgiva + 10 %.
Fosfat: standardgiva.
Kalium: standardgiva + 15 %.

Behandling av utsäde

En kort snabb väckning av utsädet, eller en korrekt förgroddning rekommenderas.Plantera helst knölarna i varm jord, eftersom den här sortens utveckling är långsam i början.Att ta bort groddar kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 20 cm (66.500 plantor/ha)
35/55 mm: 27 cm (49.000 plantor/ha)

Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 ºC. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 ºC. Lämplig för medellång lagring.

[1] Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9
Brunröta: något till inte mottaglig / 9
Vanlig skorv: mottaglig / 5
Gul nematod Ro 1/4: - / -
Gul nematod Ro 2/3: - / -
Vit nematod Pa 2: - / -
Vit nematod Pa 3: - / -
Pulverskorv: mottaglig / 5
Fusarium: något mottaglig / 6
Bakterios: något mottaglig / 6
Svartpricksjuka: något mottaglig / 6
Rost: något mottaglig / 6
Virus - Bladrull: - / -
Virus - A: - / -
Virus - X: något mottaglig / 6,5
Virus - Yn: något mottaglig / 7
Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7
Potatiskräfta ras 1: resistent / 10
Potatiskräfta ras 6: - / -
Potatiskräfta ras 18: - / -

Agrico Nordic • Kompanigatan 1-2 • 553 05 Jönköping • Sverige
+46 36 372040 info@agriconordic.com www.agricopotatoes.se

AGRICO | NORDIC