

Ditta.

Mångsidig medelsen sort som mat- och salladspotatis, lämplig för konventionell och ekologisk odling.




Ekologiskt



Matpotatis
Pack
Sallad

- » **Utmärkt konsumtionskvalitet**
- » **God lagringsduglighet**
- » **Flera resistenser**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Nieder Österreichische
Saatbaugenossenschaft

Korsning: BINTJE x QUARTA

Förädlarrätt: Fri sort

Nummersort: SW 80-0540

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6

Knölform: lång oval / LO

Köttfärg: ljusgul / 6,5

Knölsättning: ganska hög / 7

Knölstorlek: ganska stora / 7

Skalfärg: gul / Y

Blomfärg: vit / W

Antal bär: väldigt många / 4

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5

Blast - slutlig utveckling: tidig / 8

Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5

Blast - styrka: ganska tålig / 7

Ljus groddens färg: blå-violett / BV

Knölens regelbundenhet: Jämn / 7

Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5

Skalfinish: bra / 7

Groningsvila: ganska lång / 7

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 369

Koktyp: fast / A

Groningsvila: ganska lång / 7

Mekaniska skador: känslig / 5,5

Bentazon: ganska känslig / 6,5

Etylen: - / -

Återväxt: ganska känslig / 6

Växtsprickor: ganska känslig / 6,5

Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7

Torrsubstanshalt: 20,2%

Fördelning av torrsubstans: - / -

TGA-nivå: -

Missfärgning efter råskalad: mycket känslig / 4

Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6

Friterings kvalitet: under genomsnittet / 5,5

Chips kvalitet: olämpligt / 4

Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva - 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantor/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad, men sällan någon minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5,5

Brunröta: något mottaglig / 7

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: något mottaglig / 6,5

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: något mottaglig / 7

Svartpricksjuka: något mottaglig / 6

Rost: mottaglig / 5

Virus - Bladrull: något mottaglig / 7

Virus - A: något till inte mottaglig / 9

Virus - X: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yn: något mottaglig / 7,5

Virus - Yntn (knöl): mottaglig / 5

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -