ODLINGSREKOMMENDATION


Ditta.

Mångsidig medelsen sort som mat- och salladspotatis, lämplig för konventionell och ekologisk odling.

- **Utmärkt konsumtionskvalitet**
- **God lagringsduglighet**
- **Flera resistenser**

Ekologiskt

Matpotatis
Pack
Sallad



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Korsning: BINTJE x QUARTA
Förädlarrätt: Fri sort
Nummersort: SW 80-0540

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6
Knölform: lång oval / LO
Köttfärg: ljusgul / 6,5
Knölsättning: ganska hög / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: väldigt många / 4
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: ganska tålig / 7
Ljus groddens färg: blå-violett / BV
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: bra / 7
Groningsvila: ganska lång / 7

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 369
Koktyp: fast / A
Groningsvila: ganska lång / 7
Mekaniska skador: känslig / 5,5
Bentazon: ganska känslig / 6,5
Etylen: - / -
Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblått (inre blåmärken): något känslig / 7
Torrsubstanshalt: 20,2%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: -
Missfärgning efter råskalad: mycket känslig / 4
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6
Friterings kvalitet: under genomsnittet / 5,5
Chips kvalitet: olämpligt / 4
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Agrico har gjort alla rimliga ansträngningar för att ta fram denna sortbeskrivning. Observera dock att all information kan komma att ändras och Agrico tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Agrico kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av eller i samband med informationen i denna beskrivning.

AGRICO | NORDIC

ODLINGSREKOMMENDATION

Odlingsråd

Gödsling [1]

Kväve: standardgiva - 10 %.
Fosfat: standardgiva.
Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylen, helst efter en kort snabb väckning.Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantor/ha)
35/50 mm: 27 cm (50.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad, men sällan någon minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 ºC. Lämplig för medellång lagring.

[1] Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5,5
Brunröta: något mottaglig / 7
Vanlig skorv: något mottaglig / 6
Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9
Gul nematod Ro 2/3: - / -
Vit nematod Pa 2: - / -
Vit nematod Pa 3: - / -
Pulverskorv: något mottaglig / 6,5
Fusarium: något mottaglig / 6
Bakterios: något mottaglig / 7

Svartpricksjuka: något mottaglig / 6
Rost: mottaglig / 5
Virus - Bladrull: något mottaglig / 7
Virus - A: något till inte mottaglig / 9
Virus - X: något till inte mottaglig / 8
Virus - Yn: något mottaglig / 7,5
Virus - Yntn (knöl): mottaglig / 5
Potatiskräfta ras 1: resistent / 10
Potatiskräfta ras 6: - / -
Potatiskräfta ras 18: - / -

Agrico Nordic • Kompanigatan 1-2 • 553 05 Jönköping • Sverige
+46 36 372040 info@agriconordic.com www.agricopotatoes.se

AGRICO | NORDIC