

Fontane.

En medelsen sort med hög avkastning för fritering eller medeltidig mjölig matpotatis.

- **Stora knölar**
- **Hög TS-halt**
- **Lämplig för olika typer av jord**



Industri
Fritering



Matpotatis
Pack



Skaleri



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Lantmännen Seed B.V.
Korsning: AGRIA x AR 76-034-03
Förädlarrätt: 31-12-2028
Nummersort: SW 87-1140

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 5,5
Knölform: oval / 0
Köttfärg: ljusgul / 6,5
Knölsättning: ganska hög / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: över genomsnittlig / 5
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: medel / 7
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6
Blast - styrka: ganska tålig / 7
Ljus groddens färg: blå-violett / BV
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6
Skalfinish: ganska dålig / 5
Groningsvila: ganska kort / 5,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 430
Koktyp: mjölig / BC
Groningsvila: ganska kort / 5,5
Mekaniska skador: ganska känslig / 6
Bentazon: ganska känslig / 6
Etylen: 15-25 % fler knölar / 7
Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: ganska känslig / 6
Stöttblätt (inre blåmärken): ganska känslig / 6
Torrsubstanshalt: 23,2%
Fördelning av torrsubstans: genomsnittlig / 6,5
TGA-nivå: 6,1 mg/100g
Missfärgning efter råskalad: känslig / 5,5
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5
Friterings kvalitet: mycket bra / 7,5
Chips kvalitet: genomsnittligt / 6
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 30 %. Det är möjligt att använda stallgödsel.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än två gånger kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantor/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantor/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 °C. Lämplig för lång lagring.



Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5

Brunröta: något mottaglig / 6,5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: något mottaglig / 6

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: något mottaglig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: - / -

Rost: något mottaglig / 6,5

Virus - Bladrull: något mottaglig / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: något mottaglig / 7

Virus - Yn: mottaglig / 5,5

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7

Potatiskräfta ras 1: ganska mottaglig / 6

Potatiskräfta ras 6: måttligt mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 18: - / -