

Gourmandine.

En tidig matpotatissort och salladsspecialitet med ett attraktivt, slätt skal och en behaglig fyllig smak.

- » **Fast kokning**
- » **Snygg presentation**
- » **God lagringsduglighet**



Matpotatis
Sallad
Delikatess



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Bretagne Plants
Korsning: CHARLOTTE x ESTIMA
Förädlarrätt: 31-12-2032
Nummersort: 92 F 229-11

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medeltidig / 7
Knölform: lång oval / LO
Köttfärg: ljusgul / 6,5
Knölsättning: ganska hög / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: lila / P
Antal bär: normalt / 6
Blast - inledande utveckling: normal / 6
Blast - slutlig utveckling: medel / 7
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6
Blast - styrka: ganska tålig / 7
Ljus groddens färg: röd-violett / RV
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: bra / 7
Groningsvila: lång / 8

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 354
Koktyp: fast / A
Groningsvila: lång / 8
Mekaniska skador: något känslig / 7
Bentazon: ganska känslig / 6,5
Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: något känslig / 7
Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7
Torrsubstanshalt: 19,4%
Fördelning av torrsubstans: utmärkt / 8
TGA-nivå: 5,2
Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6
Friterings kvalitet: genomsnittligt / 6
Chips kvalitet: olämpligt / 4
Karvon-olja: 5 % färre till 5 % fler knölar / 5

Odlingsråd

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

30/40 mm: 22 cm (60.500 plantor/ha)

40/50 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 4 °C. Lämplig för lång lagring.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4,5

Brunröta: något mottaglig / 6

Vanlig skorv: mycket mottaglig / 4,5

Gul nematod Ro 1/4: - / -

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: något mottaglig / 6,5

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: mycket mottaglig / 4

Svartpricksjuka: mottaglig / 5

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: något mottaglig / 6

Virus - A: något till inte mottaglig / 9

Virus - X: mycket mottaglig / 4

Virus - Yn: något mottaglig / 6

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 6

Potatiskräfta ras 1: resistent* / 10*

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -