

Jacky.

En liten medeltidig matpotatis med hög avkastning och resistenser mot bladmögel och brunröta.

- ▶ **Något mjölig**
- ▶ **Hög knölsättning**
- ▶ **God tolerans mot stöttblått och mekaniska skador**



Ekologiskt



Matpotatis
Pack
Kulpotatis



Skaleri



characteristics

Allmänna egenskaper

Förädlare: Lantmännen Seed B.V.

Korsning: ANOUK x ATHLETE

Förädlarrätt: 31-12-2049

Nummersort: SW 09-0557

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medeltidig / 6,5

Knölform: rund oval / RO

Köttfärg: ljusgul / 6,5

Knölsättning: hög / 9

Knölstorlek: normal / 6,5

Skalfärg: gul / Y

Blomfärg: ljuslila / LP

Antal bär: under genomsnittlig / 6,5

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5

Blast - slutlig utveckling: ganska tidig / 7,5

Blast - renbarhet: ganska lätt / 7

Blast - styrka: ganska tålig / 7

Ljus groddens färg: grön-röd / GR

Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5

Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6

Skalfinish: över genomsnittlig / 6,5

Groningsvila: ganska kort / 5,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 368

Koktyp: något mjölig / B

Groningsvila: ganska kort / 5,5

Mekaniska skador: något till inte känslig / 8

Bentazon: - / -

Etylen: 15-25 % fler knölar / 7

Återväxt: ganska känslig / 6

Växtsprickor: ganska känslig / 6,5

Stöttblått (inre blåmärken): något till inte känslig / 8

Torrsubstanshalt: 20,1%

Fördelning av torrsubstans: bra / 7

TGA-nivå: 14,05

Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6

Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5

Friterings kvalitet: under genomsnittet / 5,5

Chips kvalitet: olämpligt / 5

Karvon-olja: 5 % färre knölar / 4

How to grow

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantor/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 9

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: mycket mottaglig / 2

Fusarium: mottaglig / 5,5

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: något mottaglig / 6

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: mottaglig / 5

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -