


King Edward.

En mjölig matpotatis som är lämplig som bakpotatis och till potatismos.



Matpotatis
Pack

- ▶ **Bra kokkvalité**
- ▶ **Bakpotatis**
- ▶ **Hög TS**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Korsning: MAGNUM BONUM x BEAUTY OF HEBRON
Nummersort:

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 5
Knölform: oval / 0
Köttfärg: ljusgul / 5
Knölstorlek: stora / 8
Skalfärg: gul med röda ögon / Y/R
Blomfärg: lila / P
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6
Blast - styrka: ganska tålig / 7
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6
Regelbundenhet i storleken: Ganska ojämn / 5
Skalfinish: genomsnittlig / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 432
Koktyp: något mjölig / B
Groningsvila: genomsnittligt / 6
Återväxt: känslig / 5
Växtsprickor: ganska känslig / 6
Stöttblått (inre blåmärken): något känslig / 7
Torrsubstanshalt: 23,3%
TGA-nivå:
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6
Friterings kvalitet: olämpligt / 5
Chips kvalitet: genomsnittligt / 6

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 25 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

Behandling av utsäde

-

Sättavstånd

30/35 mm: 22 cm (60.500 plantor/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 plantor/ha)

Ogräs

Metribuzin (Sencor) poäng är ännu inte fastställda.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 4 °C. Lämplig för medellång lagring.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5

Brunröta: mycket mottaglig / 4

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Fusarium: något mottaglig / 7

Rost: mottaglig / 5

Virus - Yn: mycket mottaglig / 4