

Kuras.



Industri
Stärkelse

Sen sort för odling av stärkelse,
motståndskraftig mot
potatiscystnematoder och med mycket
bra stärkelseavkastning.

- ▶ **Vit köttfärg**
- ▶ **God lagringsduglighet**
- ▶ **God resistens mot virus och bladmögel**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: G. Kuper
Korsning: PG 285 x AR 69-0491
Förädlarrätt: Fri sort
Nummersort: KU 80-1271

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 4
Knölform: rund oval / RO
Köttfärg: vit / 4,5
Knölsättning: genomsnittligt / 6
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: väldigt många / 4
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7
Blast - slutlig utveckling: ganska tidig / 7,5
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5
Ljus groddens färg: blå-violett / BV
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6
Regelbundenhet i storleken: Jämn / 7
Skalfinish: ganska dålig / 5
Groningsvila: ganska kort / 5,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 490
Koktyp: mjölig / C
Groningsvila: ganska kort / 5,5
Mekaniska skador: känslig / 5,5
Bentazon: - / -
Etylen: - / -
Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: något känslig / 7
Stöttblätt (inre blåmärken): ganska känslig / 6
Torrsubstanshalt: 25,9%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: 33,8
Missfärgning efter råskalad: - / -
Grå missfärgning (efter kokning): mycket känslig / 4,5
Friterings kvalitet: under genomsnittet / 5,5
Chips kvalitet: olämpligt / 4,5
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 5 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plantor/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad, men sällan någon minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Ett förebyggande sprutschema mot bladmögel rekommenderas.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blstdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.



Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 8

Brunröta: något till inte mottaglig / 8

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: resistent / 9

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Pulverskorv: något mottaglig / 6,5

Fusarium: något mottaglig / 7

Bakterios: mottaglig / 5

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: - / -

Rost: något mottaglig / 6,5

Virus - Bladrull: något mottaglig / 7

Virus - A: något till inte mottaglig / 9

Virus - X: något till inte mottaglig / 8,5

Virus - Yn: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 9

Potatiskräfta ras 1: resistent / 10

Potatiskräfta ras 6: ganska mottaglig / 5

Potatiskräfta ras 18: - / -