

Nofy.

En sen stärkelsesort med god avkastning och resistenser mot bladmögel och brunröta.

- » **Hög TS-halt**
- » **Bra lagringsduglighet**
- » **Bra virusresistens**



Ekologiskt



**Industri
Stärkelse**



characteristics

Allmänna egenskaper

Förädlare: AKV Langholt
Korsning: STAYER x AR 02-3921
Förädlarrätt: 31-12-2048
Nummersort: PL 08-4007

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: sen / 5
Knölform: oval rund / OR
Köttfärg: ljusgul / 6,5
Knölsättning: ganska hög / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: under genomsnittlig / 7
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: ganska lätt / 7
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5
Ljus groddens färg: grön-röd / GR
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: ganska dålig / 5
Groningsvila: ganska lång / 7,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 471
Koktyp: mjölig / BC
Groningsvila: ganska lång / 7,5
Mekaniska skador: ganska känslig / 6
Bentazon: något till inte känslig / 8
Etylen: 15-25 % fler knölar / 7
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: något till inte känslig / 8
Stöttblätt (inre blåmärken): ganska känslig / 6
Torrsubstanshalt: 25,2%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: 15,37
Missfärgning efter råskalad: - / -
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5
Friterings kvalitet: olämpligt / 4
Chips kvalitet: olämpligt / 4,5
Karvon-olja: 25 % fler knölar / 8

How to grow

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantor/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för lång lagring.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 8,5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: något mottaglig / 6

Vit nematod Pa 2: något mottaglig / 5

Vit nematod Pa 3: mottaglig / 2

Pulverskorv: mycket mottaglig / 4,5

Fusarium: - / -

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: något till inte mottaglig / 8

Rost: mycket mottaglig / 4,5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 6,5

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 9

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -