

Thalia.

Thalia är en medelsen matpotatis med attraktivt skal, lång groningsvila och bra resistenser mot pallidanematoder.



**Matpotatis
Pack**



Skaleri

- » **Attraktiv gul köttfärg**
- » **Fastkokande**
- » **Lämplig för långlagring**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Lantmännen Seed B.V.
Korsning: BELANA x AR 01-3576
Förädlarrätt: 31-12-2051
Nummersort: SW 10-8218

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 5,5
Knölform: oval / 0
Köttfärg: gul / 7
Knölsättning: ganska hög / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: vit / W
Antal bär: över genomsnittlig / 5,5
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - renbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: ganska tålig / 7,5
Ljus groddens färg: röd / R
Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6,5
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: över genomsnittlig / 6,5
Groningsvila: lång / 8

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 385
Koktyp: fast / A
Groningsvila: lång / 8
Mekaniska skador: känslig / 5
Bentazon: - / -
Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6
Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: något till inte känslig / 8
Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7
Torrsustanshalt: 21%
Fördelning av torrsustans: - / -
TGA-nivå: 3,3
Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6,5
Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5
Friterings kvalitet: genomsnittligt / 6
Chips kvalitet: olämpligt / 5
Karvon-olja: 5 till 15 % fler knölar / 6

Odlingsråd

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva + 15 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 15 %.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Sättavstånd

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter bladdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för lång lagring.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: mottaglig / 5

Brunröta: något mottaglig / 7,5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: mottaglig / 3

Gul nematod Ro 2/3: mottaglig / 2

Vit nematod Pa 2: fältresistent / 8

Vit nematod Pa 3: fältresistent / 7

Pulverskorv: - / -

Fusarium: något till inte mottaglig / 8

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: mycket mottaglig / 3,5

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: mottaglig / 5

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 6,5

Potatiskräfta ras 1: mycket mottaglig / 1

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -