


Armedi.

An early maincrop processing variety suitable for the French fries industry.



Industri
Fritering

- ▶ **Tålig mot rost.**
- ▶ **Utmärkt kvalitet efter fritering och kan lagras länge.**
- ▶ **Bra resistenser mot olika typer av cystnematoder.**



characteristics

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.

Korsning: TOPAS x BASIN RUSSET

Förädlarrätt: 31-12-2051

Nummersort: AR 10-2432

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 5,5

Knölform: oval lång / OL

Köttfärg: ljusgul / 6

Knölsättning: genomsnittligt / 6,5

Knölstorlek: ganska stora / 7,5

Skalfärg: gul / Y

Blomfärg: lila / P

Antal bär: normalt / 6

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7

Blast - slutlig utveckling: tidig / 8

Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5

Blast - styrka: tålig / 8

Ljus groddens färg: - / -

Knölens regelbundenhet: Jämn / 7

Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5

Skalfinish: genomsnittlig / 6

Groningsvila: genomsnittligt / 6,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 402

Koktyp: mjölig / C

Groningsvila: genomsnittligt / 6,5

Mekaniska skador: mycket känslig / 4,5

Bentazon: - / -

Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6

Återväxt: ganska känslig / 6

Växtsprickor: något känslig / 7

Stöttblätt (inre blåmärken): ganska känslig / 6,5

Torrsubstanshalt: 21,8%

Fördelning av torrsubstans: genomsnittlig / 6,5

TGA-nivå: 6,0

Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6,5

Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7

Friterings kvalitet: utmärkt / 8

Chips kvalitet: bra / 7

Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

How to grow

Gödsling ¹

Kväve: standardgiva - 5 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 25 %.

Behandling av utsäde

En kort snabb väckning av utsädet, eller en korrekt förgröddning rekommenderas. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (55.000 plants/ha)

35/55 mm: 34 cm (40.000 plants/ha)

Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 °C. Lämplig för lång lagring.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4

Brunröta: något mottaglig / 7,5

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: fältresistent / 7

Vit nematod Pa 2: resistent / 9

Vit nematod Pa 3: fältresistent / 8

Pulverskorv: mottaglig / 5,5

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: - / -

Say potato,
say **Agrico.**

Svartpricksjuka: mottaglig / 5,5

Rost: något mottaglig / 7,5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: mycket mottaglig / 4,5

Virus - Yntn (knöl): - / -

Potatiskräfta ras 1: något mottaglig / 9

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -