
ODLINGSREKOMMENDATION

Armedi.

An early maincrop processing variety suitable for the French fries industry.

Industri
Fritering

- **Tålig mot rost.**
- **Utmärkt kvalitet efter fritering och kan lagras länge.**
- **Bra resistenser mot olika typer av cystnematoder.**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: TOPAS x BASIN RUSSET
Förädlarrätt: 31-12-2051
Nummersort: AR 10-2432

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 5,5
Knölform: oval lång / OL
Köttfärg: ljusgul / 6
Knölsättning: genomsnittligt / 6,5
Knölstorlek: ganska stora / 7,5
Skalfärg: gul / Y
Blomfärg: lila / P
Antal bär: normalt / 6
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6,5
Blast - styrka: tålig / 8
Ljus groddens färg: - / -
Knölens regelbundenhet: Jämn / 7
Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5
Skalfinish: genomsnittlig / 6
Groningsvila: genomsnittligt / 6,5

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 402
Koktyp: mjölig / C
Groningsvila: genomsnittligt / 6,5
Mekaniska skador: mycket känslig / 4,5
Bentazon: - / -
Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6
Återväxt: ganska känslig / 6
Växtsprickor: något känslig / 7
Stöttblått (inre blåmärken): ganska känslig / 6,5
Torrsubstanshalt: 21,8%
Fördelning av torrsubstans: genomsnittlig / 6,5
TGA-nivå: 6,0 mg/100g
Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6,5
Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7
Friterings kvalitet: utmärkt / 8
Chips kvalitet: bra / 7
Karvon-olja: 15-25 % fler knölar / 7

Agrico har gjort alla rimliga ansträngningar för att ta fram denna sortbeskrivning. Observera dock att all information kan komma att ändras och Agrico tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Agrico kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av eller i samband med informationen i denna beskrivning.

AGRICO | NORDIC

ODLINGSREKOMMENDATION

Odlingsråd

Gödsling [1]

Kväve: standardgiva + 10 %.
Fosfat: standardgiva.
Kalium: standardgiva + 25 %.

Behandling av utsäde

En kort snabb väckning av utsädet, eller en korrekt förgroddning rekommenderas.En ordentlig förgroddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen.

Sättavstånd

28/35 mm: 25 cm (55.000 plants/ha)
35/55 mm: 34 cm (40.000 plants/ha)

Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

På grund av att den är känslig för svartpricksjuka och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst tre veckor efter blastdödning.

Lagringstemperatur - Lagringstid

För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 ºC. Lämplig för lång lagring.

[1] Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4
Brunröta: något mottaglig / 7,5
Vanlig skorv: mottaglig / 5,5
Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9
Gul nematod Ro 2/3: fältresistent / 7
Vit nematod Pa 2: resistent / 9
Vit nematod Pa 3: fältresistent / 8
Pulverskorv: mottaglig / 5,5
Fusarium: något mottaglig / 6
Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: mottaglig / 5,5
Rost: något mottaglig / 7,5
Virus - Bladrull: - / -
Virus - A: - / -
Virus - X: - / -
Virus - Yn: mycket mottaglig / 4,5
Virus - Yntn (knöl): - / -
Potatiskräfta ras 1: något mottaglig / 9
Potatiskräfta ras 6: - / -
Potatiskräfta ras 18: - / -

Agrico Nordic • Kompanigatan 1-2 • 553 05 Jönköping • Sverige
+46 36 372040 info@agriconordic.com www.agricopotatoes.se

AGRICO | NORDIC