CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Vogue.

یکساں جسامت کے بڑے آلوؤں والی دوسری اگیتی پکنے والی قسم۔

روایتی

- پکنے میں قدرے سخت
- بڑے آلو
- جلد تیار ہونے والی فصل

خصوصیات

عمومی خصوصیات

قسم تیار کرنے والے: Konst Research B.V.
ہائبرڈ اسلاف: MARABEL x AMOROSA
قسم تیار کرنے والے کا حق: 31-12-2046
پیڑن: KO 03-2027

پودے اور آلو کی خصوصیات

پختگی: دوسری اگیتی / 6,5
سوئے کا ہلکا رنگ: سبز سرخ / GR
پھول کا رنگ: سفید / W
بیریز کی تعداد: پست زیادہ / 4
پتے - ابتدائی نشوونما: کچھ تیز / 7
پتے - تمام نشوونما: کچھ اچھا / 7,5
پتے - مضبوطی: کچھ مضبوط / 7
پتے - انتخاب کی اہلیت: درمیانہ / 6
چھلکے کا رنگ: پیلا / Y
جلد کا رنگ: پیلا / 7
چھلکے کی عمدگی: درمیانی / 6
آلو کی شکل: بیضوی لمبا / OL
آلو کی شکل کی یکسانیت: باقاعدہ / 7
آلو بننے کا عمل: درمیانہ / 6
آلو کی جسامت: بڑا / 8
جسامت کی یکسانیت: باقاعدہ / 7
سست رو (غیر فعالیت): کچھ مختصر / 5

حساسیت اور معیار

ٹانوں نمو: کچھ حساس / 6,5
سیاہ دھبہ (اندرونی داغ): معمولی سے غیر حساس / 8
بڑھوتری کی دراڑیں: کچھ حساس / 6,5
کٹائی کے دوران نقصان: کچھ حساس / 6
میٹریبوزن: معمولی سے غیر حساس / 8
میٹریبوزن: معمولی سی حساس / 7,5
ینٹلزون: معمولی سی حساس / 7
ایتھیلین: 5% کم سے 5% زیادہ آلو / 5
زیر آب وزن: 311
خشک مادے کی مقدار: 17,3%
کھانا پکانے کی قسم: قدرے سخت / AB
سرمئی بدرنگی (کھانا پکانے کے بعد): معمولی حساس / 7,5
خام بدرنگی: - / -
آلو کے چپس (فرنچ فرائز) کا معیار: غیر موزوں / 5
خشک مادے کی تقسیم: - / -
خستگی کا معیار: غیر موزوں / 4
ٹن جمالے - درجہ: 3,7
کارووِن کا تیل: 25% زیادہ آلو / 8

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

کاشت کی ہدایات

کھاد کا استعمال اور بیج کا حلچ [1]

نائٹروجن: تجویز کردہ مقدار - 10% تجربہ کی طور پر حصول میں استعمال، اگلے بننے کے عمل کے فوراً بعد دوسرا استعمال۔

فاسفیٹ: تجویز کردہ معیار۔

پوٹاشیم: تجویز کردہ مقدار + 10%۔

بیج کی کا حلچ

اپریل کے موڈل کو اترنے کے بعد بیجوں کو مٹی میں بونے سے پہلے موئے پھوٹنے کا انتظار کرنا اگلوں پر مثبت نتیجہ دے کر سکتا ہے۔ کیا سے زیادہ مرتبہ موئے کاٹنے سے پیداوار اور جسامت کی باقاعدگی پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔

بوائی کا فاصلہ

28/35 ملی میٹر: پودے 4-6 انچ، کھیلیاں 25-30 انچ (67.000 پودے/ہیکٹر)

35/55 ملی میٹر: پودے 4-6 انچ، کھیلیاں 25-30 انچ (54.000 پودے/ہیکٹر)

جڑ بوٹیاں

زمین سے اگنے کے بعد، میٹریبوزن (سینکور) کے معیار استعمال سے پتوں پر ردعمل نہیں ہوتا یا پیداوار میں کمی نہیں آتی۔

پھپھوندی کُش ادویات

پچھیتا جھلساؤ کے خلاف درست حفاظتی چھڑکاؤ کا سخت لائحہ عمل ضرور ہے۔

فصل کی کٹائی

میلو دھبے اور/یا کٹائی کے دوران پنچنے والے نقصان کی شدت کی وجہ سے، بیلوں کو کاٹنے کے بعد فصل کی کٹائی سے پہلے کم از کم تین ہفتے تک انتظار کریں۔

ذخیرہ کاری کا درجہ حرارت - ذخیرہ کاری کا وقت

ذخیرہ کاری کا ترجیحی درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے براہِ راست کھیت سے ترسیل یا قلیل مدتی ذخیرہ کے لیے موزوں ہے۔

Say potato, say Agrico.

مزاحمتی

وائرس - پتوں کا مڑ جانا: - / -

وائرس - Yn: معمولی سی اثر پذیر / 6,5

وائرس - Yntn (آلو): اثر پذیر / 5

چھڑکاؤ: پتہ اثر پذیر / 4

پچھیتا جھلساؤ - پتے: پتہ اثر پذیر / 4

پچھیتا جھلساؤ - آلو: معمولی سی اثر پذیر / 6

فیوزاریم (پھپھوندی): معمولی سی اثر پذیر / 6,5

خاہ کھرنڈ (چترل): معمولی سی اثر پذیر / 6

سفوفی کھرنڈ (چترل): پتہ اثر پذیر / 2

وائرس - A: - / -

وائرس - X: معمولی سے غیر اثر پذیر / 8

میلو نکتہ: پتہ اثر پذیر / 4,5

اروینیل: - / -

مسے کی بیماری F1: معمولی اثر پذیر / 9

مسے کی بیماری F6: - / -

مسے کی بیماری F18: - / -

سنہری خیطہ (کیچوا) Ro 1: مزاحم / 9

سنہری خیطہ (کیچوا) Ro 2/3: - / -

سفید خیطہ (کیچوا) Pa 2: - / -

سفید خیطہ (کیچوا) Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com